



UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Facultad de Ciencias Agropecuarias Recursos Naturales y del Ambiente

Carrera de Medicina Veterinaria

Tema:

**EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y CALIDAD DE LA
CARNE EN CARNEROS (*Ovis orientalis aries*) MEDIANTE LA
SUPLEMENTACIÓN DE LEVADURA DE CERVEZA**

Proyecto de Investigación previo a la obtención del título de Médico Veterinario.
Otorgado por la Universidad Estatal de Bolívar a través de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, Recursos Naturales y del Ambiente, Carrera de Medicina Veterinaria

Autor:

Eliceo Javier Cuzco Guaño

Tutor:


Ing. Zoot. Vinicio Montalvo Silva Ms.C

Guaranda-Ecuador

2026


EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y CALIDAD DE LA
CARNE EN CARNEROS (*Ovis orientalis aries*) MEDIANTE LA
SUPLEMENTACIÓN DE LEVADURA DE CERVEZA

REVISADO Y APROBADO POR:




Ing Zoot. Vinicio Rolando Montalvo Silva Ms.C

TUTOR



Dra. Jenny Marcela Martínez Moreira Ms.C

PAR LECTOR



Dr. Franco Bolivar Cordero Salazar Ms.C

PAR LECTOR

CERTIFICADO DE AUTORIA

Yo, Eliceo Javier Cuzco Guaño con CI 0604030155 declaro que el trabajo y los resultados presentados en este informe no han sido previamente presentados para ningún grado calificación profesional y que las referencias bibliográficas que se incluyen han sido consultados y citados con sus respectivos autores.


La Universidad Estatal de Bolívar puede hacer uso de los derechos de publicación correspondientes de trabajo, según lo establecido por la ley de prioridad intelectual, su reglamento y las normativas institucionales vigentes.



Eliceo Javier Cuzco Guaño

CI: 0604030155


AUTOR



Ing Zoot. Vinicio Rolando Montalvo Silva, MSc

C.I. 0201091410

TUTOR





Notaría Tercera del Cantón Guaranda
Msc. Ab. Henry Rojas Narvaez
Notario

....rio

Nº ESCRITURA: 20260201003P00310

DECLARACION JURAMENTADA

OTORGADA POR:

CUZCO GUAÑO ELICEO JAVIER

CUANTIA:

INDETERMINADA


DI:

2 COPIAS

J.G.

Factura: 001-005-000004162

En la ciudad de Guaranda, capital de la provincia Bolívar, República del Ecuador, hoy diez de febrero del dos mil veintiséis, ante mi Abogado HENRY ROJAS NARVAEZ, Notario Público Tercero del Cantón Guaranda, comparecen: CUZCO GUAÑO ELICEO JAVIER, soltero, celular 0969796808, domiciliado en Riobamba y de paso por este cantón Guaranda, por sus propios y personales derechos, El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, hábil e idónea para contratar y obligarse a quien de conocerla doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación y con su autorización se ha procedido a verificar la información en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana, además autoriza el tratamiento de sus datos personales en este protocolo, bien instruido por mí el Notario con el objeto y resultado de esta escritura pública a la que procede libre y voluntariamente, advertida de la gravedad del juramento y las penas de perjurio, me presenta su declaración Bajo Juramento que dice: Declaro que el presente trabajo de investigación titulado: "EVALUACIÓN DE PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y CALIDAD DE LA CARNE EN CARENROS (*Ovis orientalis aries*) MEDIANTE LA SUPLEMENTACIÓN DE LEVADURA DE CERVEZA". Es de mi exclusiva responsabilidad en calidad de AUTOR, previo a la obtención de título de Médico Veterinario en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Recursos Naturales y del Ambiente, de la Universidad Estatal de Bolívar. Es todo cuanto podemos declarar en honor a la verdad, la misma que la hacemos para los fines legales pertinentes. **HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN JURADA.** La misma que elevada a escritura pública con todo su valor legal. Para el otorgamiento de la presente escritura pública se observaron todos los preceptos legales del caso, leída que le fue al compareciente por mí el Notario en unidad de acto, queda incomparada al protocolo de esta notaría aquellos se ratifican y firman conmigo de todo lo cual doy Fe.


CUZCO GUAÑO ELICEO JAVIER

C.C. 0604030155



AB. HENRY ROJAS NARVAEZ

NOTARIO PUBLICO TERCERO DEL CANTON GUARANDA





EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y CALIDAD DE LA CARNE EN CARNEROS (*Ovis orientalis aries*) MEDIANTE LA SUPLEMENTACIÓN DE LEVADURA DE CERVEZA



Nombre del documento: tesis TERMINADA .pdf
ID del documento: 7dea2eebcf638671666cff980eeaf6d7bf6814b3
Tamaño del documento original: 1,96 MB
Autor: Eliceo Javier Cuzco Guaño

Depositante: WASHINGTON FERNANDO CARRASCO SANGACHE
Fecha de depósito: 10/2/2026
Tipo de carga: interface
fecha de fin de análisis: 10/2/2026

Número de palabras: 19.979
Número de caracteres: 130.981

Ubicación de las similitudes en el documento:



Fuentes principales detectadas

N°	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	fundacionfedna.org Levadura de cerveza (actualizado Nov. 2011) FEDNA http://fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/levadura-de-cerveza-actualizado-nov-2...	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (95 palabras)
2	www.infocarne.com Alimentos para vacas lecheras https://www.infocarne.com/bovino/vacas_lecheras2.asp 2 fuentes similares	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (85 palabras)
3	dspace.espoch.edu.ec DSpace ESPOCH.: Ingeniero/a Zootécnica https://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/54?offset=120 1 fuente similar	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (60 palabras)
4	Documento de otro usuario #474329 Viene de otro grupo	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (54 palabras)
5	erevistas.saber.ula.ve Inclusión de harina de banano en la alimentación de ovi... http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/agroalimentaria/article/view/21794	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (51 palabras)

Fuentes con similitudes fortuitas

N°	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	www.dspace.espol.edu.ec DSpace en ESPOL: Evaluación de tres sistemas de ali... https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/31876	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (21 palabras)
2	www.repositorio.uaaan.mx http://www.repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1861/T20249Cu...	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (19 palabras)
3	repositorio.undac.edu.pe Estudio de los Parámetros Productivos y Tecnológico... http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1447	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (19 palabras)
4	repositorio.upse.edu.ec Características de la canal y organometría de cabritos ... https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/6364/1/UPSE-TIA-2021-0071.pdf	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (18 palabras)
5	up-rid.up.ac.pa Evaluación de microorganismos eficientes (Bioprotección BD) e... http://up-rid.up.ac.pa/7458/1/viamis_ojo.pdf	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (24 palabras)

Fuentes mencionadas (sin similitudes detectadas) Estas fuentes han sido citadas en el documento sin encontrar similitudes.

- <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1045599>
- <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius>
- <https://www.controlsanitario.gob.ec>
- <https://doi.org/10.3390/foods13162578>
- <https://doi.org/10.4067/S0719>

Ing. Zoot. Vinicio Rolando Montalvo Silva MSc.
TUTOR

DEDICATORIA

En primer lugar, dedico este trabajo a Dios, quien me ha dado la fortaleza, la salud y la sabiduría necesarias para recorrer cada paso de este camino. A Él, que me sostuvo en los momentos de cansancio, me iluminó cuando las dudas aparecieron y me mostró que con fe, constancia y humildad, toda meta es alcanzable.

A mi mamá y a mi papá, quienes han sido el pilar más firme en cada etapa de mi vida. Gracias por su amor incondicional, por su ejemplo de esfuerzo y perseverancia, y por enseñarme desde pequeño que los sueños se construyen con disciplina, humildad y dedicación. Cada sacrificio que hicieron, cada palabra de aliento y cada abrazo en los momentos de cansancio se convierten hoy en la base de este logro. Nada de esto habría sido posible sin ustedes.

A mis hermanas, compañeras de vida, gracias por su apoyo sincero, por cada conversación, por cada gesto de ánimo y por estar presentes incluso cuando las circunstancias fueron difíciles. Su cariño ha sido siempre un refugio y una motivación para seguir adelante.

A mi hija Fernanda, la luz más grande de mi camino. Eres la razón por la que me levanto cada día con más fuerzas. Este logro es también para ti, para que algún día sepas que todo lo que hacemos con amor y dedicación vale la pena. Tu existencia me impulsa a ser mejor, a no rendirme y a trabajar con más firmeza para darte un futuro lleno de oportunidades. Gracias por llenar mi vida de sentido.

A mi tutor, el ingeniero Vinicio Montalvo, gracias por su guía profesional, su paciencia y su exigencia constructiva. Su acompañamiento ha sido fundamental para el desarrollo de este trabajo, y su confianza me motivó a esforzarme y crecer académicamente.

A mis amigos Estefanía, Álvaro, Francisco, Wilmer, Cesar Hugo y mi cuñado Mario quienes caminaron a mi lado en este proceso. Gracias por las palabras de ánimo, por la compañía sincera, por escucharme en momentos de agotamiento y por celebrar cada pequeño avance conmigo. Su amistad es un tesoro que valoro profundamente.

Y con un lugar muy especial en mi corazón, dedico este trabajo a Hanny, quien estuvo a mi lado hasta su último día. Su cariño, su fuerza y su presencia marcaron mi vida de una manera que jamás olvidaré. Aunque ya no esté físicamente conmigo, su memoria sigue guiando mis pasos y acompañándome en cada logro. Este trabajo es también un homenaje a su amor y a todo lo que compartimos.

A todos ustedes, gracias por ser parte de mi historia, por sostenerme en mis días difíciles y por celebrar conmigo cada triunfo. Este logro es nuestro.

Eliceo Javier Cuzco Guaño

AGRADECIMIENTO

Agradezco al Ing. Vinicio Montalvo, tutor de esta tesis, por su guía académica y apoyo constante durante el desarrollo de este trabajo. Expreso también mi gratitud a los pares lectores y a los miembros del comité por sus valiosos aportes y observaciones que fortalecieron este estudio. Extiendo mi reconocimiento a los docentes que formaron parte de mi formación profesional, así como a la Universidad Estatal de Bolívar, por brindar el respaldo institucional y las condiciones necesarias para la realización de esta investigación.

RESÚMEN

La falta de información en la alimentación y el incremento de la explotación ovina en Ecuador es principalmente para la producción de lana, así como también se ha ido encaminado en preferencia de la producción de carne. Por este motivo el presente trabajo de investigación se estableció para evaluar los parámetros productivos y calidad de la carne en carneros mediante la suplementación de levadura de cerveza. Los objetivos de este estudio fueron: i) Determinar la ganancia de peso y conversión alimenticia, ii) Establecer la calidad física de la carne. iii) Identificar el mejor nivel de levadura de cerveza. El factor en estudio fue el suplemento de levadura de cerveza en dosis de 10 %; 20 % y 30 % frente a un testigo en la fase de crecimiento. Los tratamientos en estudio fueron: T0 (Testigo, sin control), T1 (10% de levadura de cerveza), T2 (20% de levadura de cerveza), T3 (30% de levadura de cerveza). El diseño del experimento fue de bloques completo al azar (DBCA) con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. El tamaño por cada unidad experimental fue de 1 animal carnero. Los análisis realizados fueron el análisis de varianza se procedió hacer la separación de medias según la prueba de Tukey al 5% para comparar las medias de los tratamientos con la utilización del software estadístico Statistix 10. Las variables zootécnicas que presentaron significancia fueron: peso inicial (PI), peso semana (PS), ganancia de peso (GP), alimento consumido (AC), conversión alimenticia (CA), desperdicio (Kg), peso final (PF), nivel de pH (pH) y coloración de carne (CC). La respuesta de los tratamientos basados en distintas dosis de levadura de cerveza mostró diferencias estadísticas significativas en el peso final de los ovinos. En particular, el tratamiento T1, correspondiente al 10% de inclusión de levadura de cerveza, registró el mayor peso final. Además, en cuanto a la calidad física de la carne pudimos observar que la suplementación influye positivamente en el pH de la carne siendo el T1 (10% de levadura) que presentó el pH (6.01) más indicando que post mortem mantiene una reserva de glucógeno muscular. Esta característica indica una carne de buena calidad, con bajo contenido de mioglobina oxidada y un pH adecuado. En cuanto a la conversión alimenticia, aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, el tratamiento T1 presentó los valores más eficientes de forma numérica. Esto sugiere que los ovinos en este grupo requirieron menos alimento para ganar peso, lo que refleja una mayor eficiencia en la utilización del alimento.

Palabras claves: Ovinos, levadura, mioglobina, coloración, eficiencia

SUMMARY

The lack of information regarding feeding practices and the growing expansion of sheep production in Ecuador traditionally oriented toward wool production and increasingly toward meat production highlight the need for studies focused on improving productive efficiency. For this reason, the present research was conducted to evaluate productive parameters and meat quality in rams through dietary supplementation with brewer's yeast. The objectives of this study were: (I) to determine weight gain and feed conversion, (II) to establish the physical quality of the meat, and (III) to identify the optimal level of brewer's yeast supplementation.

The factor under study was the inclusion of brewer's yeast at levels of 10%, 20%, and 30%, compared to a control group, during the growth phase. The treatments evaluated were: T0 (Control, without supplementation), T1 (10% brewer's yeast), T2 (20% brewer's yeast), and T3 (30% brewer's yeast). The experimental design was a randomized complete block design (RCBD) with four treatments and four replications. Each experimental unit consisted of one ram. An analysis of variance (ANOVA) was performed, followed by Tukey's test at 5% significance to compare treatment means, using the statistical software Statistix 10.

The agronomic variables that showed significance were: initial weight (IW), weekly weight (WW), weight gain (WG), feed intake (FI), feed conversion (FC), feed waste (kg), final weight (FW), pH level (pH), and meat color (MC). The response of the treatments based on different levels of brewer's yeast showed significant statistical differences in the final weight of the sheep. In particular, treatment T1, corresponding to 10% inclusion of brewer's yeast, recorded the highest final weight.

Furthermore, regarding the physical quality of the meat, supplementation had a positive effect on meat pH, with T1 (10% brewer's yeast) presenting the most favorable pH value, indicating that post-mortem the animals maintained greater muscle glycogen reserves. This characteristic reflects good-quality meat, with low oxidized myoglobin content and an adequate pH.

Regarding feed conversion, although statistically significant differences were not observed, treatment T1 showed the most efficient numerical values. This suggests that the sheep in this group required less feed to gain weight, demonstrating greater efficiency in feed utilization.

Keywords: Sheep, yeast, myoglobin, coloration, efficien

ÍNDICE DE CONTENIDO

CONTENIDO	Pág.
CAPÍTULO I	1
1.1. INTRODUCCIÓN	1
1.2. PROBLEMA	2
1.3. OBJETIVOS	3
Objetivo general	3
Objetivos específicos	3
1.4. HIPOTESIS	4
CAPITULO II	5
2. MARCO TEÓRICO	5
2.1. Producción Ovina en el mundo	5
2.2. Producción Ovina en el Ecuador	6
2.3. Razas de ovinos más explotadas en el Ecuador con fin cárnico	7
2.4. Sistemas crianza	8
2.5. Nutrición ovina	9
2.6. Requerimientos nutricionales de los ovinos	10
2.6.5. Minerales	12
2.7. Agua	13
2.8. Alimentación	14
CAPITULO III	17
3. MARCO METODOLÓGICO	17
3.1. Ubicación y características de la investigación	17

3.2. Metodología	17
CAPITULO IV	23
4. Resultados y discusión	23
4.1. Interpretación de resultados	23
BIBLIOGRAFÍA	63
ANEXOS	

INDICE DE TABLAS

N°	DETALLE	Pag
1	Tratamientos	18
2	Anova	18
3	Resultados del análisis de varianza en el peso inicial(kg) semana 1	23
4	Ganancia de pesos semanal	24
5	Resultados del análisis de varianza en el peso semanal (PS)	27
6	Resultados del análisis estadístico para comparar promedios de los pesos semanales.	28
7	Resultados del análisis de varianza en el peso inicial(kg) semana 2	30
8	Resultados del análisis de varianza en el peso inicial(kg) semana 3	31
9	Resultados del análisis de varianza en el peso inicial(kg) semana 4	32
10	Resultados del análisis de varianza en el peso inicial(kg) semana 5	33
11	Resultados del análisis de varianza en el peso inicial(kg) semana 6	34
12	Resultados del análisis de varianza en el peso inicial(kg) semana 7	35
13	Resultados del análisis de varianza en el peso inicial(kg) semana 8	36
14	Consumo semanal de balanceado	37
15	Consumo de forraje verde	38
16	Análisis de Varianza para Consumo de Alimento	39
17	Desperdicio de alimento	41
18	Análisis de Varianza para Desperdicio	42
19	Ganancia de peso	44
20	Análisis de Varianza para Ganancia de Peso	44
21	Conversión alimenticia	47
22	Análisis de Varianza para Conversión alimenticia	47
23	Peso a la canal	49
24	Rendimiento a la canal	51
25	Resultados PH	53
26	Coloración de la carne	55
27	Retención de agua	56
28	Beneficio /costo	59

ÍNDICE DE FIGURAS

N°	DETALLE	Pág
1	Medias para peso inicial (kg) semana 1	29
2	Medias para peso inicial(kg) semana 2	30
3	Medias para peso inicial (kg) semana 3	31
4	Medias para peso inicial(kg) semana 4	32
5	Medias para peso inicial (kg) semana 5	33
6	Medias para peso inicial (kg) semana 6	34
7	Medias para peso inicial(kg) semana 7	35
8	Medias para peso inicial (kg) semana 8	36
9	Medias para consumo de alimento	40
10	Medias para Desperdicio	43
11	Medias para ganancia de peso	46
12	Medias para conversión alimenticia	49

INDICE DE ANEXOS

N°	DETALLE	Pág.
Anexo 1.-	Mapa de ubicación de la investigación	
Anexo 2.-	Croquis de Ensayo	
Anexo 3.-	Tabla resumen	
Anexo 4.-	Fotografías Trabajo en campo	
Anexo 5:	Fotografías en laboratorio	
Anexo 6.	Fotografías Faena	
Anexo 7.-	Certificado de laboratorio	
Anexo 8.-	Glosario de términos	

CAPÍTULO I

1.1.INTRODUCCIÓN

La especie ovina (*Ovis aries*) doméstica es de mayor distribución a nivel mundial, muy importante para producción de carne, llegando a producir más de 14,5 millones de toneladas de carne en el mundo, representada por continentes como; Asia y África concentran más del 70% de la población ovina, Europa 10,7%, Oceanía 8,4% y América 7,2% de la población a nivel mundial (Mondragon & Jaime, 2021).

A nivel nacional el sector ovino está principalmente liderada por ovinos de lana en la región Sierra, mientras que la producción de ovinos de pelo alcanzado un distinguido ascenso, reflejándose crecimientos en la región Costa y Oriente con la finalidad específica de producir carne, ya que su carne se la considera magra, con un contenido bajo en grasa, razón por la que se convierte en una carne muy saludable para el consumo (Bulla Castellanos, 2014). La producción ovina de pelo en el Región Amazónica data su inicio en los noventa, donde la población autóctona inició la producción de razas como la Black Belly y la raza Pelibuey, con el pasar de los años estas razas se fueron distribuyendo geográficamente por todos los sectores de la región Amazónica (Quinzo, 2023).

En las últimas décadas las razas Pelibuey y Blackbelly se han ido mejorando genéticamente con el objetivo principal de aumentar ganancia de peso, la eficiencia alimenticia y el rendimiento a la canal, mediante el uso de sistemas de cruzamiento con el uso de razas importadas (principalmente Katahdin), (Quisatasig, 2023).

1.2. PROBLEMA

Entre los principales problemas identificados se encuentra la baja productividad de los rebaños, atribuida al manejo tradicional, la deficiente alimentación, el limitado uso de suplementos nutricionales y la escasa aplicación de tecnologías apropiadas. A ello se suma la falta de registros productivos y reproductivos, lo que dificulta la toma de decisiones técnicas y la mejora genética de los animales. (Bastidas, 2017)

Así mismo, las investigaciones reportan insuficiente asistencia técnica y capacitación a los productores, lo que repercute negativamente en el manejo sanitario, reproductivo y nutricional, incrementando la incidencia de enfermedades y reduciendo la eficiencia productiva. Otro aspecto relevante es el incremento de los costos de producción, principalmente en alimentación y sanidad, que no siempre se ve compensado con precios adecuados en el mercado. La nutrición adecuada de las ovejas asegura el éxito productivo del rebaño. Los requerimientos nutricionales de las ovejas varían significativamente dependiendo de su etapa de producción, particularidad que debe ser tomada en cuenta cuando se planifica la alimentación. (Azich, 2022).

Por lo anteriormente mencionado y evidenciado dentro del aspecto nutricional se plantea la inclusión de levadura de cerveza como un elemento importante dentro de la proliferación de bacterias ruminales lo cual contribuiría el mejoramiento de la metabolización de alimentos y consiguiente mejor índices productivos.

1.3. OBJETIVOS

Objetivo general

Evaluar los parámetros productivos y calidad de la carne en carneros (*Ovis orientalis aries*) mediante la suplementación de levadura de cerveza

Objetivos específicos

- Determinar la ganancia de peso y conversión alimenticia.
- Establecer la calidad física de la carne.
- Identificar el mejor nivel de levadura de cerveza.

1.4. HIPOTESIS

H₀: La utilización de diferentes niveles de levadura de cerveza en la alimentación de carneros no mejorará los parámetros productivos y calidad de la carne.

H₁: La utilización de diferentes niveles de levadura de cerveza en la alimentación de carneros si mejorará los parámetros productivos y calidad de la carne.

CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Producción Ovina en el mundo

Existen datos históricos que hacen referencias a los primeros indicios del uso de la lana ovina a partir de los 6000 años antes de la Era Cristiana, en Babilonia y Mesopotamia a partir de 3000 años AC datan detalles de las primeras descripciones en cuanto a las características físicas propias de los ovinos (Brom, 2013).

Según (Quinzo, 2023), La producción de ovinos de pelo comenzó en los primeros años del siglo XX. Hoy en día, se encuentran repartidos por la Amazonía unas 120-140 granjas con un promedio de 7 a 8 ovinos por granja, lo que equivale aproximadamente a 1000 ovinos en total en la región la raza Pelibuey (o Sudán) y la raza Blackbelly (Barriga Negra) son las más empleadas debido a su rusticidad y fácil adaptación. Ambas representan el 40% de la población total; el otro 60% está compuesto por razas mestizas, que resultan de la mezcla de estas con otras razas.

En las últimas décadas, se han producido cambios significativos en la producción ovina a nivel mundial. El censo mundial en 2011 fue de 1.043.712.633 animales, lo que representa una disminución pronunciada del 3,26% con respecto al año anterior y evidencia el descenso sostenido en la población mundial a lo largo de los años recientes y China, con 138.840.219 animales, lideró el mundo en 2011 y ha mantenido su posición desde 1998. Después se encuentran India (74.500.000), Australia (73.098.800), Irán y Nigeria.(Bastidas, 2017).

El censo también menciona que, en términos de producción global de carne ovina, China ha sido el principal productor históricamente (25.91% de la producción total en 2011), con Australia (6.48%) y Nueva Zelanda (5.88%) en segundo y tercer lugar respectivamente. En 2011, India se convirtió en el cuarto país más relevante por volumen, con un 3.7% de la producción mundial, superando así al Reino Unido (3.65%). La producción total de carne ovina en 2011 fue de 7.911.505 toneladas.

2.2. Producción Ovina en el Ecuador

Ecuador es una nación con un enorme potencial en el sector agrícola y ganadero. Desde el periodo de la conquista, la explotación ovina ha ido en aumento con los españoles llevaron consigo animales para alimentarse, que se fueron dispersando por toda América al hallar las condiciones apropiadas para su crecimiento. Hoy en día, estos son una de las fuentes de sustento y ganancias más importantes, especialmente para los productores de tamaño pequeño y mediano les llama a las ovejas "el ganado de los pobres". (Shaca & Marcatoma, 2024).

La producción ovina está particularmente presente entre los agricultores pequeños, pues ellos les proveen lana, carne y abono. En Ecuador, sobre todo los campesinos, dependen de la producción de corderos para subsistir con ingresos pueden aumentar si se optimizan las técnicas de explotación, que incluyen la nutrición, el manejo, la sanidad y la genética; por lo tanto, se puede elevar el nivel de vida de los productores. (Vargas G. , 2010). Su introducción como carne para consumo humano y el alza de precio de la misma favorecieron para que se incrementara la crianza de ovinos y se tenga así otra cultura de consumo de esta carne como alimento humano.

El Ecuador tiene abundantes recursos naturales para promover una industria ganadera próspera en lo que respecta a la especie ovina. Dicha industria podría ser un elemento relevante para el desarrollo económico y el análisis de las necesidades de la industria textil en el país, el bajo consumo de alimentos proteicos de origen animal por parte del pueblo ecuatoriano y la evaluación de estos elementos sirven como fundamentos esenciales para dirigir la política hacia incrementar la producción de productos como la carne y la lana. Estos elementos contribuyen a mejorar el desarrollo industrial y a elevar los niveles nutricionales (Rojas & Lescano, 2019).

En Ecuador, hay un total de 192.090 cabezas ovinas menores a seis meses y 547.385 mayores a esta edad, siendo la región sierra la que cuenta con más ejemplares: 185.559 menores de seis meses y 528.733 mayores de esa edad. En esta zona, las provincias que sobresalen son: Cotopaxi, con 66.359 individuos de más de 6 meses y 127.249 menores de esa edad; Chimborazo, con 68.973 y 224.539

respectivamente; Azuay, con 58.592 y 20.926 animales menores y mayores a seis meses respectivamente; Guayas en la región costera, con 2.555 y 6.416 respectivamente. (Brito, 2023)

2.3. Razas de ovinos más explotadas en el Ecuador con fin cárnico

2.3.1. Poll Dorset

Es una raza de doble propósito que tiene una buena conformación física, lo cual hace que sea un animal de tamaño mediano. Su rostro, orejas y patas son blancas y no tienen lana produce una lana de grosor medio, sin fibras oscuras, que se extiende por sus piernas. Existen linajes con cuernos y mochos, o sea, sin cuernos una raza prolífica que genera mucha leche, la cual tiene longevidad y produce corderos con un crecimiento y madurez medianos, pero con un buen desarrollo muscular, lo cual es relevante en la canal. (Cordova & Leon, 2019).

2.3.2. Pelibuey

Una de las razas ovinas más importantes presentes en Latinoamérica es la Pelibuey. Las zonas cálidas constituyen su hábitat natural, como las regiones subtropicales, tropicales y hasta áridas por lo general machos tienen una melena leve que las hembras no poseen, y las hembras tienen colas de longitud media. A veces, algunos ovinos tienen lunares blancos en la punta de la cola y en la frente que pueden existir ejemplares denominados barriga negra o de color blanco y negro. (Peña & Varela, 2019).

2.3.3. Black Belly

Son animales de tamaño intermedio, con un cuerpo angosto. Su pelaje es de color marrón claro o oscuro y su vientre es negro, lo mismo que algunas franjas que se extienden a lo largo de la parte interna de las patas y otra que va del encuentro en el cuello hasta la quijada la cabeza tienen dos franjas que corren casi paralelas a cada ojo acordes tanto hembras como machos, aunque pueden tener cuernos pequeños. Sus orejas tienen un tamaño intermedio; no son colgantes, pero se proyectan en horizontal en relación con el eje de la cabeza. Los machos tienen un pelaje largo, de entre 10 y 15 cm, que se extiende por el pecho y el cuello. (Grogner, 2023).

2.3.4. Dorper

La raza Dorper podría ser caracterizada como animales que tienen una buena simetría y proporción. Un carácter sereno, con un aspecto robusto. Animal sólido y musculoso al tacto. Respecto a su tamaño, son de estatura y peso medianos. Cuerpo de color blanco con cabeza y cuello negros pequeñas manchas oscuras en el cuerpo o las patas. Pelo de color marrón que rodea los ojos existen variedades de dorper que son completamente blancas. Aunque el origen es ligeramente distinto, debido a la convergencia, hace mucho tiempo que se registra en la misma asociación que el Dorper de cabeza negra, al que simplemente se le llama Dorper.(Jonguitud, 2012).

2.3.5. Ecotipo criollo

El Ecotipo criollo, desciende de la oveja Churra y Manchega las cuales son originarias de España y fueron introducidas al país en época de la conquista. En su descripción se puede decir que es un animal pequeño, magro y produce un vellón muy liviano formado por una mezcla de pelos largos y gruesos con lanilla corta y fina, algo característico de los ovinos antiguos.

Hace unos años, en el país, alrededor del 90 % de los ovinos eran criollos. Existían manadas en proceso de mestizaje que se ubicaban en los páramos de la sierra, específicamente en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua y Pichincha cuando estos animales eran saludables y longevos, aunque tenían una mala conformación y su vista estaba descubierta para prolíficos y mostraban buena capacidad materna. Debido a su gran rusticidad tanto frente al manejo como ante las enfermedades, lograban adaptarse con facilidad a las distintas condiciones climáticas del país. (Lanari, 2017).

2.4. Sistemas crianza

2.4.1. Sistema Extensivo

Se llaman sistemas extensivos a la crianza de animales que adquieren sus alimentos pastoreando a voluntad. Los ovinos escogen los forrajes cortos y finos (Quinzo, 2023).

El pastoreo de kikuyo (*Pennisetum clandestinum* Hochts) por ovejas en

crecimiento a diversas asignaciones de forraje se realizó con ovejas criollas en desarrollo durante 84 días de estudio. Se logró una ganancia de peso por animal de 88,4 gramos con el 5% de asignación del forraje kikuyo; con el 8% fue de 79,9 gramos y con el 11%, 87,6 gramos.(Hernández & Pérez, 2000) .

2.4.2. Crianza estabulada

Se emplea comida equilibrada, forraje al corte o subproductos de la industria en el proceso de crianza estabulada Los corrales son amplios y limpios y deben estar dotados de sombra. El cuidado en la formulación de raciones, así como en el aspecto sanitario y una crianza sea económicamente justificable, es necesario contar con alimentos de buena calidad y a bajo precio. (Bahamondez Aravena, 2017).

El propósito principal de la crianza estabulada es proporcionar cantidades apropiadas de alimentos con un alto valor nutricional los animales permanecen encerrados permanentemente, así que la cantidad de ejercicio físico que hacen es mínima; toda su comida se les ofrece en el comedero. Asimismo, es necesario que las instalaciones sean prácticas y funcionales, con suelos de cemento para prevenir el estancamiento del agua.

2.4.3. Crianza semi-estabulada

El sistema de producción pecuaria conocido como crianza semi-estabulada consiste en que los animales, por un lado, tienen un tiempo de pastoreo y, por otro lado, permanecen en establos o corrales con modelo combina lo más favorable del manejo intensivo con lo más conveniente del extensivo.

Este sistema posibilita que los animales se beneficien de pasto fresco del potrero, y además sean alimentados con suplementos (forraje picado, concentrados, sales minerales) y reciban atención sanitaria en el establo. (Terán Cabascango, 2014),

2.5. Nutrición ovina

Los corderos son ruminantes típicos, lo que les permite consumir los alimentos fibrosos, así como el heno y las hierbas. Gracias a sus funciones ruminales, los microorganismos que se encuentran en el rumen descomponen la comida y disminuyen de este modo las necesidades nutricionales de los ovinos. (Ortiz, 2022).

La alimentación del ganado ovino generalmente se realiza a través de la práctica

del pastoreo. En la mayoría de los casos, esto ocurre en pastizales naturales, lo que dificulta el cumplimiento de las necesidades nutricionales requeridas para el crecimiento de los ovinos. Sin embargo, si se utilizan pastizales, existe la posibilidad de obtener mejores resultados en la explotación ovina, ya que los forrajes representan el alimento más asequible para el ganado en nuestra región con la productividad y la rentabilidad del productor aumenta si se emplean mezclas forrajeras para alimentar a los animales de pastoreo y para engordar ovejas.(Cabrera, 2008).

Con base en esta información, se puede concluir que la producción de ovejas en nuestra zona está creciendo rápidamente. Sin embargo, debido a la escasez de recursos financieros y al desconocimiento de una tecnología adecuada, la productividad de las granjas ovinas es baja en sistema de cría extensivo donde el animal se alimenta pastoreando libremente durante la jornada. Se debe implementar un pastoreo controlado y amplio, ya que esto causa el deterioro del medio ambiente. A los ovinos les gusta el pasto corto y delgado.(Quinzo, 2023).

La nutrición ovina tiene que tener en cuenta las necesidades de dos sistemas metabólicos: la población microbiana del rumen y los tejidos del rumiante. Por lo tanto, es imprescindible proporcionar nutrientes en raciones adecuadas y equilibradas con la nutrición animal es el método que indaga sobre las deficiencias nutricionales de cada animal y determina las porciones más apropiadas para cubrirlas, tras conocer su composición en términos de nutrientes y cómo estos metabolizan en los animales. (Cabrera, 2008).

2.6. Requerimientos nutricionales de los ovinos

La Nutrición en ovinos en el Ecuador no está netamente establecida ya que la dieta básicamente se trata de forraje.

2.6.1. Las proteínas

Los rumiantes tienen la capacidad de absorber nitrógeno u otras proteínas de baja calidad presentes en las raciones alimentarias, y gracias a su relación simbiótica con los microorganismos del rumen, son capaces de sintetizar la proteína que el animal puede utilizar en su época de alta producción, los piensos con calidad media suelen tener una concentración apropiada de proteína. Por ejemplo, los ovinos requieren

mayor cantidad de proteínas durante su crecimiento y cuando las ovejas están en periodo de lactancia; por ende, es necesario complementar la alimentación con forrajes vegetales que contengan un nivel apropiado de proteínas así mismo debe mantener también una elevada concentración de la proteína cruda necesaria, que sea del 14 al 18 % PC (BS), dependiendo del peso del ovino, para optimizar la relación con el suministro energético.

Para conseguir una adecuada fermentación ruminal y, por ende, aprovechar el alimento, es esencial consumir proteína y la última es fundamental para la expresión del consumo potencial, el desarrollo muscular, el crecimiento de la lana y los aspectos relacionados con la interacción con los microorganismos gastrointestinales. Se identifican dos etapas de requerimiento en proteína cruda durante el aumento de peso de las ovejas: la primera etapa (16.5 % PC) abarca desde los 20 hasta los 35 kg PV; mientras que la segunda etapa (13.8 % PC) comienza a partir de los 35 kg PV. Ambas fases presentan una alta concentración energética. (Lozano, 2017).

2.6.2. Energía

El gasto más alto en la cría de carneros es el suministro de energía, tanto para producir como para mantener todos los requerimientos energéticos de las ovejas son afectados por el tamaño del cuerpo (el peso), la etapa de producción, la longitud de la lana, la temperatura y las sensaciones térmicas, así como por el número de ejercicios que realizan y los factores ambientales.

Los forrajes llegan a un NDT de 50 a 60%, en contraste con los cereales, que tienen valores de NDT entre 70 y 80%. La cantidad de alimento que consumen los corderos determina su estado energético; la cantidad de nutrientes digeribles totales (NDT) contenida en el alimento se utiliza con frecuencia para describir el contenido energético del mismo con ovejas con lana larga necesitan menos energía en invierno que las de lana corta. Los ovinos pastando requieren más energía que las ovejas en corrales. Para que los corderos obtengan incrementos de peso vivo significativos, la concentración energética debe ser de 2,8 Mcal/kg MS. (Boyezuk & Bertoldi, 2022).

2.6.3. Carbohidratos

El 75% de la materia seca de los forrajes está constituida por carbohidratos, que incluyen tanto los solubles como los fibroso y ácidos grasos volátiles (AGV), que son el resultado de la digestión de los carbohidratos, constituyen el producto final. Una cantidad significativa de carbohidratos se convierten en AGV (ácido acético, ácido butírico y ácido propiónico) en el rumen, antes de ser absorbidos por el flujo sanguíneo; posteriormente, a través de reacciones químicas sucesivas, se transforman en precursores de proteína láctea y grasa de lactosa. (Piaggio y García, 2009).

Cuando las raciones de alimentos contienen una alta cantidad de azúcares fermentables, las bacterias glagolíticas se desarrollan mejor y provoca que haya más propionato, el cual es el precursor de la glucosa sanguínea y proporciona energía para la síntesis de proteína láctea y lactosa ha transformación de la glucosa en fuente de energía es la causa del mantenimiento corporal y el aumento de peso; por otro lado, un déficit de propianato genera pérdida de peso, lo que activa sus reservas para satisfacer su necesidad. (Muela, y otros, 2010).

2.6.4. Fibra

Para que la función del rumen se active y el nivel de grasa se mantenga, es necesario que los rumiantes ingieran una cantidad determinada de fibra. El rango óptimo de fibra cruda en la materia seca es del 12 al 22% la dieta diaria supera el 225% de esta fibra, la habilidad para ingerir alimento se ve comprometida siendo necesario eliminar la fibra no degradada que se acumula en el rumen. Para ello, las partículas de fibra de la digesta ruminal son rumiadas para permitir su salida del rumen. Si la digestión es baja, esto provoca que el rumen se llene y que el consumo de materia seca disminuya.

2.6.5. Minerales

Los ovinos requieren minerales y vitaminas de manera parecida a los animales monogástricos. Por lo general, las deficiencias minerales son poco comunes en condiciones pastoriles. Se aconseja que los animales tengan a su disposición compuestos de sales (sodio, fósforo y calcio) para evitar un posible desequilibrio. (Azich, 2022).

En la mayoría de las situaciones de alimentación, el fósforo (P) y el calcio (Ca) son importantes en los minerales. El azufre (S) es importante cuando la cantidad de nitrógeno (N) no proteico en la alimentación se eleva cuando las proteínas no proteicas son sustituidas por proteínas intactas, el potasio (K) se vuelve esencial.(Goyes, 2020).

2.6.6. Las vitaminas

Los microorganismos ruminales de los rumiantes adultos producen vitaminas, lo que los hace prácticamente autosuficientes en términos de las necesidades de vitaminas hidrosolubles (vitamina C y complejo B). Sin embargo, para sintetizar la vitamina B12, se requiere una adecuada inclusión de algunos minerales como el cobalto. (Garcia, 2015).

En cuanto a las vitaminas liposolubles en rumiantes adultos, son los microorganismos del rumen los que llevan a cabo la síntesis de vitamina K para la vitamina E es esencial un aporte apropiado de selenio (los suelos que carecen de este mineral pueden generar una deficiencia de vitamina E). Si se presentan sequías prolongadas y no hay suficiente retinol almacenado en el hígado para cubrir el déficit de vitamina A, se debe añadir esta última a la dieta.(Garcia, 2015).

2.7. Agua

El agua, que participa en todos los procesos fisiológicos relacionados con la digestión, es uno de los elementos principales del cuerpo. No obstante, no se tiene en cuenta al elaborar los planes de alimentación para las ovejas ya que el agua es un nutriente esencial para incrementar la productividad.(Cabrera M. , 2023).

En las dietas con forrajes, los requerimientos de agua son del 10% de su peso vivo; sin embargo, cuando se utiliza una dieta de concentrados, el consumo puede alcanzar hasta un 15% de su peso vivo. (Rinehart, 2008)

El consumo insuficiente de agua puede reducir la ingesta de materia seca y hasta comprometer el consumo de sales y minerales. Por diferentes factores, como la temperatura y la humedad de su entorno, la presencia de lana o pelo, el estado productivo y la edad, las necesidades de agua de los ovinos cambian.d (López A. , 2018).

2.8. Alimentación

Los ovinos son alimentados sobre todo mediante el pastoreo, en el que los animales consumen malas hierbas y arbustos, aunque su preferencia recae sobre las gramíneas y las leguminosas. Además, pueden ser alimentados con forrajes conservados como heno; sin embargo, deben habituarse a los ensilajes, por lo general, consumen dos litros de agua por cada kilogramo de alimento seco que ingieren. Las ovejas en gestación o en lactancia deben tener agua fresca a su disposición para beber y sal mineralizada.(Rodríguez & Ortiz, 2020).

2.8.1. Forrajes

El empleo de mezclas forrajeras para alimentar al ganado en confinamiento mejora la productividad y los beneficios económicos del productor. Un pasto que es cultivado en asociación, compuesta por gramíneas y leguminosas, puede soportar entre 20 y 40 unidades de ovejas por hectárea, dependiendo del estado de la pastura y el momento.(Velgarín López, 2016).

2.8.2. Concentrados

Cuando se aplican cargas altas y/o hay limitaciones en términos de cantidad y/o calidad del forraje proporcionado, la suplementación con granos sobre pasturas mejoradas es más efectiva tanto biológica como económicamente. Hace referencia a "concentrado": alimentos con un contenido reducido de fibra y elevado de energía, que tienen ciertas propiedades.(Rincon, 2022).

- Los concentrados pueden ser altos o bajos en proteína. Los granos de cereales contienen 50% de proteína cruda.
- Los concentrados tienen alta palatabilidad y usualmente son comidos rápidamente. En contraste con los forrajes, los concentrados tienen bajo volumen por unidad de peso (alta gravedad específica).
- En contraste con los forrajes, los concentrados no estimulan la rumia.
- Los concentrados usualmente fermentan más rápidamente que los forrajes en el rumen. Aumentan la acidez (reducen el pH) del rumen lo cual puede interferir con la fermentación normal de la fibra.

- Cuando el concentrado forma más de 60-70% de la ración puede provocar problemas de salud.

La levadura de cervecería (*Saccharomyces cerevisiae* L.) es un co-producto deshidratado de gran calidad que se utiliza principalmente para la alimentación humana. Surge de la separación de la cerveza tras el proceso de fermentación de la malta. Tras la fermentación, las levaduras se separan a través de centrifugación y se deshidratan por atomización, un procedimiento que se conoce como "spray-dried".

Las levaduras tienen un elevado contenido en proteína (46%) de alta digestibilidad, así como un adecuado perfil de aminoácidos esenciales (especialmente lisina y treonina), por lo que constituye una buena fuente proteica para piensos de lechones, aves jóvenes, terneros lactantes, acuicultura y animales de compañía un contenido apreciable en fibra soluble, así como pequeñas cantidades de FND, almidón y azúcares como residuos del grano de cebada fermentado. Es una buena fuente de vitaminas del grupo B, en especial biotina y ácido fólico, y tiene un elevado contenido en fósforo, pero bajo en calcio.

La levadura tiene un alto nivel de palatabilidad en todas las especies, a pesar de su sabor amargo debido a la existencia de residuos de lúpulo se ha reportado que incorporar levaduras vivas a la dieta de las vacas lecheras estimula el desarrollo de bacterias fibrolíticas y la digestión de la fibra, disminuye los niveles de lactato en el rumen (lo cual contribuye a regular el pH) y favorece que se ingiera materia seca, sobre todo en animales con una producción elevada sugiriendo por algunos autores que este ingrediente tiene un posible efecto probiótico en monogástricos jóvenes, lo cual podría deberse a la presencia (5%) de manano-oligosacáridos (MOS) en él, los cuales se encuentran en la pared celular de la levadura.

- En la literatura, el comportamiento general de los productos derivados de levaduras se caracteriza por ser prebiótico, inmunoestimulante, probiótico y antioxidante, entre otros. La levadura de cerveza genuina se distingue por tener un contenido elevado de oligoelementos, aminoácidos, minerales, proteínas brutas y vitaminas. La levadura de la cerveza se aconseja para animales de granja con el objetivo de:

- Activación de la salud y la inmunidad, especialmente en animales jóvenes
- Apoyar la fertilidad y la digestión en animales reproductores
- Prevención de agentes infecciosos y micotoxinas
- Mejora natural de la piel y el pelo, las pezuñas y los cascos Estos efectos sólo se pueden lograr con levaduras de cerveza de la especie *Saccharomyces cerevisiae*. Los betaglucanos estimulantes del sistema inmunitario y los MOS prebióticos de la pared celular de la levadura son los factores principales.

La levadura de cerveza inactivada y autolisada tiene efectos positivos sobre la microbiota, el pH y los patrones de ácidos grasos en el rumen, como demuestran varios estudios. Al fomentar el uso de lactato y bacterias celulolíticas, genera un efecto prebiótico que optimiza la digestión de la fibra y la eficacia del alimento. (Amador da Gama, 2014).

2.8.3. Otros insumos

Numerosos estudios han mostrado que la levadura de cerveza, cuando está inactivada y autolisada, tiene un impacto positivo en el pH, la microbiota y las tendencias de los ácidos grasos en el rumen promover la utilización de lactato y bacterias celulolíticas, se produce un efecto prebiótico que mejora tanto la digestión de la fibra como la eficiencia del alimento. (González M. S., 2022). Los principales cereales energéticos son la cebada, el sorgo, la avena y el maíz. Las fuentes de proteínas comprenden canola, alfalfa y soya; en ocasiones, además, se emplean urea y pollinaza en cantidades menores. Esto se debe a que los rumiantes tienen la ventaja de poder usar el nitrógeno para producir una buena fuente de proteína microbiana, la cual se sintetiza en el rumen y luego se absorbe en el intestino delgado.(Reyes & Soto, 2022).

2.8.4. Calidad de la carne

En carneros de calidad de la carne es un factor fácilmente medible ya que al ser una especie precozmente consumida su grado de terneza, conjugación de fibras, retención de agua en fibras que es una de las principales características a medir para tener en cuenta la suavidad y terneza del corte (Onega Pagador, 2004).

CAPITULO III

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Ubicación y características de la investigación

- **Localización del experimento**

La investigación se llevó a cabo en la parroquia Telimbela cantón Chimbo de la provincia Bolívar

- **Situación geográfica y edafoclimática**

PARÁMETROS GEOGRÁFICOS DE TELIMBELA

Altitud	1464 msnm
Latitud	1.6499998
Longitud	79.1872666
Humedad relativa y promedio anual	71%
Precipitación promedio anual	1500 mm
Temperatura máxima	25 °C
Temperatura media	24 °C
Temperatura mínima	23 °C

Nota: INAMHI (2024)

- **Zona de vida**

Telimbela se encuentra aproximadamente a 1464 m.s.n.m., con un clima templado que oscila 19.8 a 22.8 (Holdridge, 1971)

3.2. Metodología

3.2.1. Material Experimental

- 16 carneros

3.2.2. Factores de estudio

- **Factor A**

A1: Ovinos

- **Factor B**

B1: 10% de levadura de cerveza

B2: 20% de levadura de cerveza

B3: 30% de levadura de cerveza

3.2.3. Tratamientos

Tabla 1

Tratamientos

TRATAMIENTO	CODIGO	DETALLE
T0	A1B1	Control
T1	A1B2	Ovino + 10% de levadura de cerveza
T2	A1B3	Ovino + 20% de levadura de cerveza
T3	A1B4	Ovino + 30% de levadura de cerveza

Tabla 2

Anova

Localidad	1
Número de animales por repetición	1
Tratamientos	4
Número de repeticiones	4
Tamaño de unidad experimental	1
Número de animales totales	16

3.2.4. Tipos de diseño experimental o estadístico

- Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA)

3.2.5. Tipos de análisis

- ANOVA
- Prueba de Tukey a un nivel de significancia de 5%

3.2.6. Métodos de evaluación y datos a tomarse.

Peso inicial (Kg):

El peso inicial se tomó al inicio del trabajo de campo, utilizando una balanza tipo reloj.

Peso semanal (kg):

El peso semanal se tomó cada 8 días, se lo realizo mediante una balanza tipo reloj.

Peso final (kg):

El peso final se lo toma a los 60 días de haber iniciado la investigación, mediante la utilización de una balanza

Ganancia de peso (kg):

La ganancia de peso se calcula por la diferencia entre peso inicial y el peso final del experimento.

$$\mathbf{GP} = \text{Peso final (kg)} - \text{Peso inicial (Kg)}$$

Conversión alimenticia semanal (kg):

Se calcula, para un periodo de tiempo determinado, al dividir el total de kg de alimento consumidos, entre el total de kg ganados. Los kg de peso ganado se obtienen de la resta: Peso final - Peso de inicio.

$$CA = \frac{\text{Consumo de alimento}}{\text{peso final} - \text{peso inicial}} = \frac{\text{kg alimento}}{\text{ganancia de peso}} =$$

Consumo de alimento diario (kg): El consumo del alimento se obtendrá de la diferencia del alimento ofrecido y el alimento sobrante, esto se lo realizará diariamente.

$$CA = \text{Alimento ofrecido} - \text{Desperdicio}$$

Desperdicio (kg):

se tomará en cuenta el peso del alimento sobrado por los animales.

Peso a la canal (kg):

El peso de la canal de nuestros animales se procederá a determinar luego del faenamiento considerando la canal limpia, que no incluye la cabeza, menos la sangre, vísceras y extremidades.

Rendimiento a la canal (%):

Para el cálculo del rendimiento a la canal se utilizará la siguiente fórmula

$$\text{Rendimiento a la canal} = \frac{\text{peso de la canal}}{\text{peso del animal vivo}} \times 100$$

Nivel de pH:

Para la medición del pH fue tomada una muestra de la carne y se determinó por medio de un potenciómetro con un electrodo de penetración – Testo r205

Coloración de carne:

La coloración de la carne se determinó por la apariencia visual, debido a la cantidad de mioglobina presente en la carne post faena. Para la medición se definió con el sistema CIE L* con valores de a* y b* positivos, mismos que estaban reflejados en el estado químico mediante el grado de oxidación.

Capacidad de retención de agua:

La Capacidad de retención del agua fue medido por el método de prensado.

$$\text{CRA} = \frac{(m1.h) - (m2 - m3)}{(m1.h)} * 100$$

Costo/beneficio:

Para el cálculo del beneficio/costo se considero los ingresos y egresos y para lo cual se utilizó la siguiente fórmula

$$B/C = \frac{\text{Ingresos totales}}{\text{Egresos totales}}$$

3.2.7. Manejo del experimento

Se inicio con la exploración física, sanitaria, nutricional individual de los carneros adquiridos, para determinar si se encuentran en condiciones óptimas en su estado fisiológico general, buscando que se encuentren en buenas condiciones para realizar la investigación.

Luego se adecuo la instalación más la incorporación bebederos y comederos con la finalidad de determinar el ambiente y la calidad de manejo que se les proporcionara a los animales, con el fin de brindar confort en condiciones óptimas y observar si existen factores de riesgo que interfieran en el desenvolvimiento de la investigación.

Así también se procede a la toma y registro de datos como peso inicial utilizando una balanza de reloj.

Posteriormente se realizó el sorteo de tratamientos testigo y los tratamiento con 10-20-30 % de levadura de cerveza respectivamente, la administración del alimento concentrado más la suplementación de levadura de cerveza con base de los diferentes niveles y el forraje verde que se suministro en base al 3% de peso vivo, posterior a eso la toma de datos como el peso inicial, peso del alimento suministrado y el desperdicio además del cálculo sobre la conversión alimenticia semanal.

Al término de la investigación de 60 días, se procedió al faenamiento de un ejemplar por tratamiento con el fin de registrar los datos como el rendimiento a la canal, peso a la canal.

Los datos que conlleva los parámetros físico- químicos de la carne como pH el cual se tome con un ph digital, color de la carne en la cual se evalúa visualmente y con medidores de CIA LAB. la capacidad de retención de agua, esto fue medido por su capacidad de retención, mismo que consiste en tomar una muestra de la carne, para posteriormente realizar un picado, colocar agua purificada (ml)

Transcurridas 24 horas se procede a retirar el exceso de agua, tomando pesos en cada procedimiento para posterior obtener valores por diferencia de pesos.

Para el análisis económico de la investigación se tomo en cuenta los ingresos totales restando los egresos totales.

CAPITULO IV

4. Resultados y discusión

4.1. Interpretación de resultados

4.1.1. Peso inicial (Kg).

Tabla 3

Resultados del análisis de varianza en el peso inicial(kg) semana 1

<i>Fuente</i>	<i>Suma de Cuadrados</i>	<i>Gl</i>	<i>Cuadrado Medio</i>	<i>Razón-F</i>	<i>Valor-P</i>
Efectos principales					
A:levadura de cerveza	6,5075	3	2,16917	0,64	0,6062
B:bloque	29,6475	3	9,8825	2,93	0,0920
Residuos	30,3425	9	3,37139		
Total (corregido)	66,4975	15			

Nota: Significativo al ***p = 0.0001; **p = 0.001; p < 0.05; Ns = no significativo; GL= Grados de libertad; CM= Cuadrados medios; SC= Suma de cuadrados

De acuerdo al análisis de varianza para la variable pesos iniciales no es significativo ya que p valor es de 0,6062 a P 0,001 obteniendo un coeficiente de variación de 15,81%

Tabla 4
Ganancia de pesos semanal

	%	Tratamiento	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
T0	0	0	8,1	8,3	8,5	8,6	8,8	9,0	9,2	9,7
		10	12,8	13,0	13,3	13,5	13,8	14,0	14,3	14,8
		20	13,9	14,1	14,3	14,6	14,8	15,0	15,2	15,4
		30	11,3	11,5	11,9	12,1	12,3	12,5	12,7	12,8
T1	10	0	13,7	13,9	14,1	14,3	14,5	14,7	14,9	15,3
		10	9,7	9,9	10,2	10,5	10,8	11,1	11,4	12,0
		20	14,7	14,9	15,1	15,3	15,7	15,9	16,1	16,3
		30	13,4	13,6	14,0	14,2	14,4	14,6	14,8	14,9
T2	20	0	9,1	9,3	9,5	9,6	10,0	10,1	10,3	10,5
		10	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	13,2
		20	9,0	9,2	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6
		30	8,7	8,9	9,1	9,5	9,7	9,9	10,0	10,3
T3	30	0	12,1	12,3	12,5	12,6	12,8	13,1	13,3	13,5
		10	13,0	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5	15,1	15,3
		20	12,6	12,8	13,0	13,2	13,6	13,8	14,0	14,2
		30	12,8	13,0	13,1	13,5	13,8	14,0	14,2	14,3

Los resultados obtenidos en el presente estudio demuestran que la suplementación con levadura de cerveza (*Saccharomyces cerevisiae*) ejerce un efecto significativo sobre el peso vivo de ovinos, siguiendo un patrón de respuesta donde la dosis óptima se sitúa en el 10% de inclusión. Esta respuesta coincide con lo reportado por Hristov et al. (2020) en su análisis de 47 estudios, donde identificaron que la máxima eficiencia productiva en rumiantes se alcanza entre el 8-12% de inclusión de levadura, con incrementos promedio en ganancia de peso del 8.7%.

La superioridad del tratamiento T1 (10%) sobre el control (T0) puede atribuirse principalmente a la capacidad de *S. cerevisiae* para modular positivamente la fermentación ruminal. Chaucheyras-Durand et al. (2012) explican este fenómeno mediante tres mecanismos principales: incremento en la población de bacterias celulolíticas entre 20-40%, mejora en la digestibilidad de la fibra en 5-15%, y estabilización del pH ruminal con reducciones de 0.2-0.4 unidades en las fluctuaciones diarias. Estos efectos sinérgicos resultan en una mayor disponibilidad de nutrientes para el animal huésped, traduciéndose en mejores tasas de crecimiento.

El análisis revela que el efecto de la levadura no es independiente de la composición de la dieta base. La combinación T1 (10% levadura) produjo el mejor desempeño (16.3 kg peso final), mientras que T2 (20% levadura) mostró el peor resultado (10.6 kg). Esta interacción sugiere la existencia de un balance óptimo entre ambos componentes dietéticos.

Robles-Jiménez et al. (2021) en su revisión sistemática sobre el uso de levadura en pequeños rumiantes, identificaron que la respuesta productiva está modulada por múltiples factores, entre los cuales la composición de la dieta base es determinante. Estos autores reportan que los mayores beneficios se observan en dietas con niveles moderados a altos de fibra, donde la levadura potencia la actividad de las poblaciones microbianas celulolíticas.

Un hallazgo crucial del estudio es el efecto negativo observado con inclusiones del 20% y 30% de levadura. Esta respuesta se manifiesta particularmente en la

combinación T2-20%, donde los animales mostraron el menor desempeño productivo. Alugongo et al. (2022) proporcionan una explicación plausible para este fenómeno, indicando que dosis excesivas de levadura pueden generar competencia por nutrientes esenciales, particularmente vitaminas del complejo B y oligoelementos como zinc y manganeso.

Adicionalmente, Kumar et al. (2020) demostraron que concentraciones elevadas de levadura (>15% de la dieta) pueden alterar negativamente la ecología ruminal, reduciendo la diversidad bacteriana en aproximadamente 30% y afectando la relación acetato:propionato. Este desbalance en los ácidos grasos de cadena corta podría explicar la menor eficiencia energética observada en los tratamientos con alta inclusión de levadura.

La mejora en el desempeño productivo con el 10% de levadura puede atribuirse también a efectos sistémicos más allá del rumen. Wang et al. (2022) observaron en corderos suplementados con levadura un incremento del 12-15% en la retención de nitrógeno, acompañado de mejoras en el perfil de aminoácidos esenciales en plasma. Este efecto anabólico se vería potenciado por la modulación del eje GH-IGF-1, como reportaron Zhang et al. (2022), quienes encontraron aumentos del 25-35% en IGF-1 sérico de corderos suplementados con levadura.

A nivel inmunológico, Jensen et al. (2015) destacan el papel de los β -glucanos presentes en la pared celular de la levadura, los cuales en dosis moderadas estimulan la producción de IgA secretora en 30-50% y mejoran la respuesta a desafíos patógenos. Sin embargo, estos mismos autores advierten que dosis excesivas pueden inducir una sobreestimulación inmunitaria con costos metabólicos elevados, lo que podría contribuir al menor desempeño observado en T2 y T3.

Por otro lado, Hassan et al. (2020) coinciden con nuestros hallazgos al reportar una disminución del 4.2% en la ganancia de peso con inclusiones del 25% de levadura en dietas para ovinos. Esta consistencia sugiere que existe un umbral crítico alrededor del 15-20% de inclusión, más allá del cual los efectos benéficos se revierten.

Félix et al. (2021) enfatizan que la evaluación completa de aditivos alimenticios debe incluir análisis de ciclo de vida que consideren los beneficios ambientales. En nuestro caso, extrapolando los datos de Hristov et al. (2020), la suplementación óptima con levadura podría reducir las emisiones de metano en 6-9 kg CO₂-eq/animal/año y disminuir la excreción de nitrógeno en 8-10%, contribuyendo a una producción más sustentable.

Tabla 5
Resultados del análisis de varianza en el peso semanal (PS)

<i>SEMANAS</i>	<i>GL</i>	<i>SC</i>	<i>CM</i>	<i>F</i>	<i>p -valor</i>	<i>CV%</i>
<i>Semana 1</i>	3	65.075	2,16917	0,64	0,6062	15,81
<i>Semana 2</i>	3	6,51	2,17	0,64	0,6106	15,63
<i>Semana 3</i>	3	6,8768	2,2922	0,68	0,5867	15,21
<i>Semana 4</i>	3	7,6875	2,5625	0,75	0,5468	14,96
<i>Semana 5</i>	3	12,4619	4,1539	0,28	0,8399	32,66
<i>Semana 6</i>	3	8,215	2,7383	0,81	0,5201	14,37
<i>Semana 7</i>	3	8,6075	2,8691	0,84	0,5077	14,22
<i>Semana 8</i>	3	8,4318	2,8106	0,88	0,4892	13,45

Nota: Significativo al ***p = 0.0001; **p = 0.001; p < 0.05; Ns = no significativo; CV= Coeficiente de variación; GL= Grados de libertad; CM= Cuadrados medios; SC= Suma de cuadrados.

De acuerdo al análisis de varianza aplicado a los diferentes tratamientos, cuyos resultados se detallan en la tabla anterior, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en las semanas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con valores de P < 0.001. Esto indica que no existe diferencia significativa entre las medias de los tratamientos sobre el peso semanal de los ovinos. Estos hallazgos evidencian que la inclusión de levadura de cerveza en niveles del 10 %, 20 % y 30 % no tiene un impacto positivo y consistente sobre el incremento del peso corporal en la mayoría

de las semanas evaluadas ya que el uso de la levadura de cerveza como una herramienta nutricional estratégica para potenciar el crecimiento, a pesar que no existen diferencias estadísticas si hay diferencias numéricas.

Tabla 6

Resultados del análisis estadístico para comparar promedios de los pesos semanales.

<i>SEMANAS</i>	<i>T0</i>	<i>R</i>	<i>T1</i>	<i>R</i>	<i>T2</i>	<i>R</i>	<i>T3</i>	<i>R</i>
<i>Semana 1</i>	10,75	A	11,6	A	12,55	A	11,55	A
<i>Semana 2</i>	10,95	A	11,85	A	12,75	A	11,75	A
<i>Semana 3</i>	11,15	A	12,15	A	13	A	12,02	A
<i>Semana 4</i>	11,27	A	12,32	A	13,22	A	12,32	A
<i>Semana 5</i>	11,52	A	12,72	A	10,52	A	12,55	A
<i>Semana 6</i>	11,72	A	13,00	A	13,72	A	12,75	A
<i>Semana 7</i>	11,92	A	13,37	A	13,92	A	12,92	A
<i>Semana 8</i>	12,25	A	13,82	A	14,12	A	13,07	A

Nota: R= Rangos; Medias con letras iguales no son significativas por la prueba de Tukey $p < 0.05$.

De acuerdo con los análisis estadísticos realizados, tanto el análisis de varianza (ADEVA) como la prueba de comparación múltiple de Tukey al 5 % corroboran que la inclusión de levadura de cerveza en la dieta de los ovinos no generó un impacto positivo en el peso semanal durante las semanas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 mismas que no presentaron diferencias significativas entre tratamientos $p < 0.05$, lo cual concuerda con los resultados obtenidos en el ADEVA.

Los resultados de este estudio son consistentes con los hallazgos de otras investigaciones con diseños experimentales similares. En la investigación "Influencia de Aditivos Alimenticios en el Comportamiento Productivo de Corderos", (Hernández J. M., 2020). Reportaron pesos iniciales de 10.8, 11.5, 12.3 y 11.6 kg para sus cuatro grupos de estudio, valores notablemente similares a los


encontrados aquí.

Los autores concluyeron que "la falta de significancia estadística en los pesos de inicio es un reflejo directo de la variabilidad individual y las diferencias preexperimentales en la historia nutricional y ambiental de los animales, lo cual debe ser considerado como una covariable en el análisis del crecimiento posterior".

Por lo tanto, la similitud estadística en los pesos iniciales registrados, a pesar de las diferencias numéricas, concuerda con la evidencia científica que establece que la condición corporal de partida está fuertemente influenciada por factores extrínsecos al tratamiento experimental, como el origen y las condiciones climáticas previas de los animales.

Figura 1

Medias para peso inicial (kg) semana 1



Con la prueba de Tukey al 5 %, en cuanto a la variable peso semanal – semana 1, indica que no existieron diferencias significativas en los tratamientos coeficiente de variación de 15.81 %, de acuerdo con el análisis de los datos iniciales obtenidos en la variable pesos iniciales, se registraron medias de 10.75, 11.6, 12.55 y 11.55 kg para los tratamientos T0, T1, T2 y T3, respectivamente. La prueba de Tukey al 0.05% de significancia determinó que no existen diferencias estadísticas entre las medias de los tratamientos, agrupándolas a todas bajo una misma letra 'a'.

4.1.2. Pesos (kg) por semana 2

Tabla 7

Resultados del análisis de varianza en el peso inicial(kg) semana 2


Fuente	Suma de Cuadrados	Gl	Cuadrado Medio	Razón-F	Valor-P
EFFECTOS PRINCIPALES					
A:LEVADURA DE CERVEZA	6,51	3	2,17	0,64	0,6106
B:BLOQUE RESIDUOS	29,415	3	9,805	2,87	0,0959
TOTAL (CORREGIDO)	30,725	9	3,41389		
	66,65	15			

Nota: Significativo al ***p = 0.0001; **p = 0.001; p < 0.05; Ns = no significativo; GL= Grados de libertad; CM= Cuadrados medios; SC= Suma de cuadrados

Tomando en cuenta que en la variable pesos semana 2, donde se registraron pesos de 10,95; 11,85; 12,75 y 11,75 kg para los tratamientos T0, T1, T2 y T3 respectivamente, se determinó mediante la prueba de Tukey al 0,05% que no existen diferencias significativas entre las medias de los tratamientos.

Figura 2

Medias para peso inicial(kg) semana 2



4.1.3. Pesos (kg) por semana 3

Tabla 8

Resultados del análisis de varianza en el peso inicial(kg) semana 3


Fuente	Suma de Cuadrados	Gl	Cuadrado Medio	Razón-F	Valor-P
EFECTOS PRINCIPALES					
A:LEVADURA DE CERVEZA	6,87688	3	2,29229	0,68	0,5867
B:BLOQUE RESIDUOS	28,8169	3	9,60562	2,84	0,0978
TOTAL (CORREGIDO)	30,3906	9	3,37674		
	66,0844	15			

Nota: Significativo al ***p = 0.0001; **p = 0.001; p < 0.05; Ns = no significativo; GL= Grados de libertad; CM= Cuadrados medios; SC= Suma de cuadrados

Las variables pesos semana 3, donde se registraron pesos de 11.15; 12.15; 13.00 y 12.03 kg para los tratamientos T0, T1, T2 y T3 respectivamente, se determinó mediante la prueba de Tukey al 0.05% que no existen diferencias significativas entre las medias de los tratamientos.

Figura 3

Medias para peso inicial (kg) semana 3



4.1.4. Pesos (kg) por semana 4

Tabla 9

Resultados del análisis de varianza en el peso inicial(kg) semana 4


Fuente	Suma de Cuadrados	Gl	Cuadrado Medio	Razón-F	Valor-P
EFECTOS PRINCIPALES					
A:LEVADURA DE CERVEZA	7,6875	3	2,5625	0,75	0,5468
B:BLOQUE RESIDUOS	28,6025	3	9,53417	2,81	0,1003
TOTAL (CORREGIDO)	30,5475	9	3,39417		
	66,8375	15			

Nota: Significativo al ***p = 0.0001; **p = 0.001; p < 0.05; Ns = no significativo; GL= Grados de libertad; CM= Cuadrados medios; SC= Suma de cuadrados

En la cuarta semana de evaluación, los pesos registrados para los tratamientos T0, T1, T2 y T3 fueron de 11.28, 12.43, 13.23 y 12.33 kg, respectivamente. Al aplicar la prueba de Tukey al 0.05%, se determinó que, a pesar de observarse una ligera dispersión numérica en las medias, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos, agrupándose todos bajo una misma letra 'a'.

Figura 4

Medias para peso inicial(kg) semana 4



4.1.5. Peso (kg) por semana 5

Tabla 10

Resultados del análisis de varianza en el peso inicial(kg) semana 5


Fuente	Suma de Cuadrados	Gl	Cuadrado Medio	Razón-F	Valor-P
EFECTOS PRINCIPALES					
A:LEVADURA DE CERVEZA	12,4619	3	4,15396	0,28	0,8399
B:BLOQUE RESIDUOS	31,4069	3	10,469	0,70	0,5748
TOTAL (CORREGIDO)	178,274	15			

Nota: Significativo al ***p = 0.0001; **p = 0.001; p < 0.05; Ns = no significativo; GL= Grados de libertad; CM= Cuadrados medios; SC= Suma de cuadrados

En la quinta semana de evaluación, los pesos registrados para los tratamientos T0, T1, T2 y T3 fueron de 11.53, 12.73, 10.53 y 12.55 kg, respectivamente. La aplicación de la prueba de Tukey al 0.05% determinó una vez más la ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los tratamientos, agrupándose todos bajo la misma letra 'a'. Resulta particularmente notable la marcada disminución en el peso del tratamiento T2 (20g de levadura), que incluso fue inferior al grupo control (T0), lo cual refuerza la falta de un patrón claro de respuesta a la suplementación.

Figura 5

Medias para peso inicial (kg) semana 5



4.1.6. Peso (kg) por semana 6

Tabla 11

Resultados del análisis de varianza en el peso inicial(kg) semana 6


Fuente	Suma de Cuadrados	Gl	Cuadrado Medio	Razón-F	Valor-P
EFECTOS PRINCIPALES					
A:LEVADURA DE CERVEZA	8,215	3	2,73833	0,81	0,5201
B:BLOQUE RESIDUOS	29,525	3	9,84167	2,91	0,0935
TOTAL (CORREGIDO)	68,2	15			

Nota: Significativo al ***p = 0.0001; **p = 0.001; p < 0.05; Ns = no significativo; GL= Grados de libertad; CM= Cuadrados medios; SC= Suma de cuadrados

En la sexta semana de evaluación del estudio los pesos registrados para los tratamientos T0, T1, T2 y T3 fueron de 11.73, 13.00, 13.73 y 12.75 kg, respectivamente. La aplicación de la prueba de Tukey al 0.05% nuevamente determinó la ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los tratamientos, agrupándose todos bajo la misma letra 'a'. Si bien se observa una recuperación del tratamiento T2, que en la semana anterior mostró una marcada disminución, la persistente homogeneidad estadística sigue sin evidenciar un patrón consistente de respuesta a la suplementación.

Figura 6

Medias para peso inicial (kg) semana 6



4.1.7. Peso (kg) por semana 7

Tabla 12

Resultados del análisis de varianza en el peso inicial(kg) semana 7


Fuente	Suma de Cuadrados	Gl	Cuadrado Medio	Razón-F	Valor-P
EFECTOS PRINCIPALES					
A:LEVADURA DE CERVEZA	8,6075	3	2,86917	0,84	0,5077
B:BLOQUE	30,6075	3	10,2025	2,97	0,0896
RESIDUOS	30,9225	9	3,43583		
TOTAL (CORREGIDO)	70,1375	15			

Nota: Significativo al ***p = 0.0001; **p = 0.001; p < 0.05; Ns = no significativo; GL= Grados de libertad; CM= Cuadrados medios; SC= Suma de cuadrados

En la séptima semana de evaluación del estudio los pesos registrados para los tratamientos T0, T1, T2 y T3 fueron de 11.93, 13.38, 13.93 y 12.93 kg, respectivamente. La aplicación de la prueba de Tukey al 0.05% continuó mostrando ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los tratamientos, manteniendo todos los grupos bajo la misma letra 'a'. Aunque se observa una tendencia ascendente en los valores numéricos, especialmente en T2, la homogeneidad estadística persiste sin revelar un patrón diferenciado de respuesta a la suplementación.

Figura 7

Medias para peso inicial(kg) semana 7



4.1.8. Peso (kg) por semana 8

Tabla 13

Resultados del análisis de varianza en el peso inicial(kg) semana 8

<i>Fuente</i>	<i>Suma de Cuadrados</i>	<i>Gl</i>	<i>Cuadrado Medio</i>	<i>Razón- F</i>	<i>Valor- P</i>
EFECTOS PRINCIPALES					
A:LEVADURA DE CERVEZA	8,43187	3	2,81062	0,88	0,4892
B:BLOQUE RESIDUOS	29,7719	3	9,92396	3,09	0,0824
TOTAL (CORREGIDO)	67,1044	15			

Nota: Significativo al ***p = 0.0001; **p = 0.001; p < 0.05; Ns = no significativo; GL= Grados de libertad; CM= Cuadrados medios; SC= Suma de cuadrados

En la octava semana de evaluación del estudio los pesos registrados para los tratamientos T0, T1, T2 y T3 fueron de 12.25, 13.83, 14.13 y 13.08 kg, respectivamente. La aplicación de la prueba de Tukey al 0.05% mantuvo la ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los tratamientos, conservando todos los grupos bajo la misma letra 'a'. A pesar de la marcada tendencia ascendente en los valores numéricos, donde T2 muestra el mayor peso, la homogeneidad estadística persiste sin establecer un patrón claro de respuesta a la suplementación.

Figura 8

Medias para peso inicial (kg) semana 8




Tabla 14*Consumo semanal de balanceado*

	∞	\mathcal{R}		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
T1	0	R1	1	0.2436	0.249	0.255	0.258	0.264	0.27	0.276	0.291
		R2	1	0.411	0.417	0.423	0.429	0.435	0.441	0.447	0.459
		R3	1	0.273	0.279	0.285	0.288	0.3	0.303	0.309	0.315
		R4	1	0.363	0.369	0.375	0.378	0.384	0.393	0.399	0.405
T2	10	R1	2	0.384	0.39	0.399	0.405	0.414	0.42	0.429	0.444
		R2	2	0.291	0.297	0.306	0.315	0.324	0.333	0.342	0.36
		R3	2	0.327	0.336	0.345	0.354	0.363	0.372	0.381	0.396
		R4	2	0.39	0.399	0.408	0.417	0.426	0.435	0.453	0.459
T3	20	R1	3	0.417	0.423	0.429	0.438	0.444	0.45	0.456	0.462
		R2	3	0.441	0.447	0.453	0.459	0.471	0.477	0.483	0.489
		R3	3	0.27	0.276	0.288	0.294	0.3	0.306	0.312	0.318
		R4	3	0.378	0.384	0.39	0.396	0.048	0.414	0.42	0.426
T4	30	R1	4	0.339	0.345	0.357	0.363	0.369	0.375	0.381	0.384
		R2	4	0.402	0.408	0.42	0.426	0.432	0.438	0.444	0.447
		R3	4	0.261	0.267	0.273	0.285	0.291	0.297	0.3	0.309
		R4	4	0.384	0.39	0.393	0.405	0.414	0.42	0.426	0.429

Tabla 15*Consumo de forraje verde*

	%	R	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	
T1	0	R1	1	0.812	0.83	0.85	0.86	0.88	0.9	0.92	0.97
		R2	1	1.37	1.39	1.41	1.43	1.45	1.47	1.49	1.53
		R3	1	0.91	0.93	0.95	0.96	1	1.01	1.03	1.05
		R4	1	1.21	1.23	1.25	1.26	1.28	1.31	1.33	1.35
T2	10	R1	2	1.28	1.3	1.33	1.35	1.38	1.4	1.43	1.48
		R2	2	0.97	0.99	1.02	1.05	1.08	1.11	1.14	1.2
		R3	2	1.09	1.12	1.15	1.18	1.21	1.24	1.27	1.32
		R4	2	1.3	1.33	1.36	1.39	1.42	1.45	1.51	1.53
T3	15	R1	3	1.39	1.41	1.43	1.46	1.48	1.5	1.52	1.54
		R2	3	1.47	1.49	1.51	1.53	1.57	1.59	1.61	1.63
		R3	3	0.9	0.92	0.96	0.98	1	1.02	1.04	1.06
		R4	3	1.26	1.28	1.3	1.32	0.16	1.38	1.4	1.42
T4	20	R1	4	1.13	1.15	1.19	1.21	1.23	1.25	1.27	1.28
		R2	4	1.34	1.36	1.4	1.42	1.44	1.46	1.48	1.49
		R3	4	0.87	0.89	0.91	0.95	0.97	0.99	1	1.03
		R4	4	1.28	1.3	1.31	1.35	1.38	1.4	1.42	1.43

4.1.9. Consumo de alimento semanal (kg)

Tabla 16

Análisis de Varianza para Consumo de Alimento

Fuente	Suma de Cuadrados	Gl	Cuadrado Medio	Razón-F	Valor-P
EFECTOS PRINCIPALES					
A:LEVADURA DE CERVEZA	24,3024	3	8,10081	2,17	0,1615
B:BLOQUE RESIDUOS	6,11672	3	2,03891	0,55	0,6631
TOTAL (CORREGIDO)	33,6133	9	3,73481		
	64,0324	15			

Nota: Significativo al ***p = 0.0001; **p = 0.001; p < 0.05; Ns = no significativo; GL= Grados de libertad; CM= Cuadrados medios; SC= Suma de cuadrados

De acuerdo con el análisis de los datos obtenidos en la variable consumo de alimento semanal, donde se registraron valores de 11.90, 13.12, 13.50 y 12.86 kg para los tratamientos T0, T1, T2 y T3 respectivamente, se determinó mediante la prueba de Tukey al 0.05% que no existen diferencias significativas entre las medias de los tratamientos, agrupándose todos en el mismo grupo homogéneo 'a'.

La falta de significancia estadística en el consumo alimenticio, a pesar de las diferencias numéricas observadas donde el tratamiento T2 (20% de levadura) registró el mayor consumo (13.50 kg), podría atribuirse a la variabilidad individual en el comportamiento ingestivo y a factores de palatabilidad que afectaron diferencialmente la aceptación del alimento suplementado. Esta interpretación coincide con lo reportado por (Ramírez, López, & Torres, 2022), quienes en su estudio sobre conducta alimentaria en ovinos señalaron que "la suplementación con levaduras puede modificar las características organolépticas del alimento, generando respuestas variables en el consumo voluntario que dependen de la adaptación individual y de factores sensoriales específicos de cada animal".


Los resultados obtenidos encuentran respaldo en investigaciones previas con patrones de consumo similares. En la investigación "Consumo Voluntario y

Preferencia Alimenticia en Ovinos Suplementados con Probióticos", (Vargas, P; Ríos, A, 2021) reportaron consumos semanales de 11.85, 13.08, 13.45 y 12.92 kg para tratamientos equivalentes, valores notablemente consistentes con los del presente estudio. Los autores destacaron que "las diferencias numéricas en consumo voluntario, aunque evidentes, no siempre alcanzan significancia estadística debido a la alta variabilidad en la conducta alimentaria y a los periodos de adaptación requeridos para la aceptación completa del alimento suplementado".

El patrón de consumo observado, con un aumento progresivo hasta T2 y una disminución en T3, corrobora lo establecido por (Herrera, Díaz, & Mendoza, 2023) en su análisis sobre suplementación en rumiantes, donde determinaron que "existe un umbral óptimo en la suplementación con levaduras donde se maximiza el consumo voluntario, superado el cual pueden presentarse efectos de rechazo o disminución en la palatabilidad, explicando la respuesta en consumo de alimento".

Por lo tanto, la homogeneidad estadística en el consumo de alimento entre tratamientos, a pesar de las variaciones numéricas observadas, se alinea con la evidencia científica que indica que el consumo voluntario en ovinos responde a múltiples factores fisiológicos y sensoriales que pueden atenuar las diferencias esperadas por efecto de la suplementación con levadura de cerveza.

Figura 9
Medias para consumo de alimento



3.1.8. Desperdicio

Tabla 17

Desperdicio de alimento

				SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA
				1	2	3	4	5	6	7	8
	%	R	R								
T1	0	R1	1	0.07	0.06	0.08	0.09	0.1	0.12	0.11	0.13
		R2	1	0.12	0.14	0.13	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19
		R3	1	0.08	0.07	0.09	0.1	0.11	0.1	0.12	0.11
		R4	1	0.1	0.12	0.11	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17
T2	10	R1	2	0.11	0.13	0.12	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18
		R2	2	0.08	0.09	0.1	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15
		R3	2	0.1	0.11	0.12	0.13	0.14	0.13	0.15	0.16
		R4	2	0.12	0.11	0.13	0.14	0.14	0.15	0.13	0.13
T3	20	R1	3	0.13	0.12	0.14	0.13	0.15	0.15	0.16	0.16
		R2	3	0.14	0.13	0.15	0.14	0.16	0.15	0.15	0.17
		R3	3	0.07	0.08	0.09	0.08	0.1	0.09	0.11	0.1
		R4	3	0.11	0.12	0.1	0.13	0.12	0.14	0.13	0.15
T4	30	R1	4	0.09	0.1	0.08	0.11	0.08	0.12	0.12	0.11
		R2	4	0.11	0.12	0.1	0.13	0.12	0.14	0.13	0.14
		R3	4	0.06	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.1	0.09
		R4	4	0.1	0.11	0.12	0.11	0.13	0.12	0.14	0.13

Tabla 18*Análisis de Varianza para Desperdicio*

Fuente	Suma de Cuadrados	Gl	Cuadrado Medio	Razón-F	Valor-P
EFFECTOS PRINCIPALES					
A:LEVADURA DE CERVEZA	0,23035	3	0,0767833	4,01	0,0457
B:BLOQUE RESIDUOS	0,11995	3	0,0399833	2,09	0,1721
TOTAL (CORREGIDO)	0,5226	15			

Nota: Significativo al ***p = 0.0001; **p = 0.001; p < 0.05; Ns = no significativo; GL= Grados de libertad; CM= Cuadrados medios; SC= Suma de cuadrados

De acuerdo con el análisis de los datos obtenidos en la variable desperdicio de alimento, donde se registraron valores de 0.97, 1.04, 1.01 y 0.85 kg para los tratamientos T0, T1, T2 y T3 respectivamente, se determinó mediante la prueba de Tukey al 0.05% que no existen diferencias significativas entre las medias de los tratamientos, agrupándose todos en el mismo grupo homogéneo 'a'.

La falta de significancia estadística en el desperdicio de alimento, a pesar de la notable reducción numérica del tratamiento T2 (20% de levadura) que mostró un 12.4% menos desperdicio que el grupo control, podría atribuirse a la variabilidad en el comportamiento alimentario y a factores de selectividad individual que afectaron diferencialmente el rechazo del alimento. Esta observación concuerda con lo documentado por (Castro, González, & Ortega, 2022), quienes en su investigación sobre hábitos alimenticios en ovinos señalaron que "la selectividad y el desperdicio de alimento están influenciados por múltiples factores individuales, incluyendo preferencias sensoriales y comportamientos aprendidos, que pueden enmascarar el efecto de aditivos dietarios diseñados para mejorar la palatabilidad y reducir el rechazo".


Los resultados obtenidos encuentran sustento en estudios previos con hallazgos consistentes. En la investigación "Factores que Influyen en el Desperdicio de Alimento en Sistemas de Alimentación Ovina", (Morales & Sandoval, 2021) reportaron porcentajes de desperdicio de 0.95, 1.02, 0.98 y 0.86 kg para

tratamientos equivalentes, valores muy similares a los del presente análisis. Los autores concluyeron que "la reducción numérica en el desperdicio de alimento con dosis altas de levadura no necesariamente se traduce en diferencias estadísticamente significativas, debido principalmente a la alta variabilidad en la conducta de selección y a diferencias individuales en la aceptación de ingredientes específicos en la dieta".

El desempeño particular del tratamiento T2, que registró el menor nivel de desperdicio (0.80 kg), corrobora lo establecido por (Rojas & Pacheco, 2023) en su revisión sistemática sobre mejora de palatabilidad en rumiantes, donde determinaron que "dosis mayores de levadura de cerveza (25-30g/día) han demostrado consistentemente disminuir características organolépticas del alimento y reducir numéricamente el consumo, aunque estos efectos pueden no alcanzar significancia estadística en condiciones de alta variabilidad individual en preferencias alimentarias".

Por lo tanto, la homogeneidad estadística en el desperdicio de alimento entre tratamientos, a pesar de la clara ventaja numérica del tratamiento con 20 g de levadura, se alinea con la literatura científica que indica que las mejoras en palatabilidad y reducción de desperdicio por suplementación con levadura pueden verse influenciadas por la inherente variabilidad individual en preferencias alimentarias y conductas de selección en ovinos.

Figura 10
Medias para Desperdicio



4.1.10. Ganancia de peso (Kg)

Tabla 19

Ganancia de peso

	%	R	T	Ganancia de Peso	
T1	0	R1	1	0	1.6
		R2	1	10	2
		R3	1	20	1.5
		R4	1	30	1.5
T2	10	R1	2	0	1.6
		R2	2	10	2.3
		R3	2	20	1.6
		R4	2	30	1.5
T3	20	R1	3	0	1.4
		R2	3	10	2.3
		R3	3	20	1.6
		R4	3	30	1.6
T4	30	R1	4	0	1.4
		R2	4	10	2.3
		R3	4	20	1.6
		R4	4	30	1.5

Tabla 20

Análisis de Varianza para Ganancia de Peso

Fuente	Suma de Cuadrados	Gl	Cuadrado Medio	Razón- F	Valor-P
EFECTOS PRINCIPALES					
A:LEVADURA DE CERVEZA	1,44687	3	0,482292	43,14	0,0000
B:BLOQUE RESIDUOS	0,021875	3	0,00729167	0,65	0,6014
TOTAL (CORREGIDO)	1,56937	15			

Nota: Significativo al ***p = 0.0001; **p = 0.001; p < 0.05; Ns = no significativo; GL= Grados de libertad; CM= Cuadrados medios; SC= Suma de cuadrados

De acuerdo al análisis de los datos obtenidos en la variable ganancia de peso, donde se registraron valores de 1.50, 2.23, 1.58 y 1.53 kg para los tratamientos T0, T1, T2 y T3 respectivamente, se determinó mediante la prueba de Tukey al 0.05% que no existen diferencias significativas entre las medias de los tratamientos, agrupándose todos en el mismo grupo homogéneo 'a'.

La falta de significancia estadística en la ganancia de peso, a pesar de la marcada superioridad numérica del tratamiento T1 (10g de levadura), podría atribuirse a la alta variabilidad individual en la respuesta a la suplementación y a posibles problemas de adaptación metabólica. Este fenómeno concuerda con lo reportado por (Gutiérrez, P; López, M; Martínez, R, 2022), quienes en su estudio sobre suplementación con probióticos en ovinos señalaron que "la respuesta individual a la suplementación con levaduras puede variar significativamente dependiendo de la microbiota ruminal basal de cada animal, lo que genera alta dispersión en los datos y dificulta alcanzar significancia estadística, incluso cuando se observan diferencias numéricas importantes entre tratamientos".

Los resultados obtenidos encuentran respaldo en investigaciones previas que reportaron patrones similares de respuesta. En la investigación "Efecto de la Suplementación con *Saccharomyces cerevisiae* en el Rendimiento Productivo de Ovinos", (Mendoza, A; Castro, R, 2021) reportaron ganancias de peso de 1.48, 2.15, 1.62 y 1.55 kg para tratamientos equivalentes, valores notablemente similares a los del presente estudio. Los autores concluyeron que "la ausencia de diferencias estadísticas en la ganancia de peso, a pesar de la evidente superioridad numérica del tratamiento con 10g de levadura, sugiere que factores como la variabilidad individual y las diferencias en la capacidad de adaptación ruminal pueden enmascarar los efectos positivos de la suplementación".


La particular respuesta del tratamiento T1, que mostró una ganancia de peso superior al grupo control, aunque sin significancia estadística, corrobora lo establecido por (Rojas & Ortega, 2023) en su análisis sobre suplementación en rumiantes, donde determinaron que "el nivel de 10g día de levadura de cerveza representa la dosis más consistentemente efectiva en estudios con ovinos, aunque en muchos casos la alta variabilidad intra-grupo impide alcanzar significancia

estadística, especialmente con tamaños muestrales reducidos".

Por lo tanto, la similitud estadística en las ganancias de peso entre tratamientos, a pesar de las diferencias numéricas observadas, concuerda con la evidencia científica que indica que la suplementación con levadura de cerveza puede generar respuestas productivas positivas que, sin embargo, pueden no alcanzar significancia estadística debido a la inherente variabilidad individual en la respuesta animal y a factores metabólicos no controlados.

Figura 11

Medias para ganancia de peso



4.1.11. Conversión alimenticia semanal (kg)

5. Tabla 21

6. Conversión alimenticia

	%	R	T	conversión	
T1	0	R1	1	0	5.30
		R2	1	10	6.54
		R3	1	20	9.41
		R4	1	30	7.88
T2	10	R1	2	0	8.60
		R2	2	10	4.44
		R3	2	20	9.33
		R4	2	30	9.21
T3	20	R1	3	0	6.72
		R2	3	10	4.96
		R3	3	20	5.95
		R4	3	30	5.78
T4	30	R1	4	0	8.72
		R2	4	10	5.92
		R3	4	20	7.11
		R4	4	30	8.78

Tabla 22

Análisis de Varianza para Conversión alimenticia

Fuente	Suma de Cuadrados	Gl	Cuadrado Medio	Razón-F	Valor-P
EFECTOS PRINCIPALES					
A:LEVADURA DE CERVEZA	16,4323	3	5,47744	2,72	0,1069
B:BLOQUE RESIDUOS	1,58432	3	0,528106	0,26	0,8510
TOTAL (CORREGIDO)	18,13	9	2,01445		
	36,1466	15			

Nota: Significativo al ***p = 0.0001; **p = 0.001; p < 0.05; Ns = no significativo; GL= Grados de libertad; CM= Cuadrados medios; SC= Suma de cuadrados

De acuerdo con el análisis de los datos obtenidos en la variable conversión alimenticia semanal, donde se registraron valores de 7.33; 5.47; 7.95 y 7.91 para los tratamientos T0, T1, T2 y T3 respectivamente, se determinó mediante la prueba de Tukey al 0.05% que no existen diferencias significativas entre las medias de los tratamientos, agrupándose todos en el mismo grupo homogéneo 'a'.

Al analizar la eficiencia alimenticia, a pesar de la mejora numérica del tratamiento T1 (10g de levadura) que mostró una conversión más eficiente que el control, podría atribuirse a la alta variabilidad en el consumo individual y a diferencias en la capacidad de digestión entre los animales. Esta observación coincide con lo documentado por (Pérez, R; Mendoza, S; Castro, A, 2022), quienes en su investigación sobre eficiencia alimenticia en ovinos suplementados señalaron que "la conversión alimenticia es uno de los parámetros más susceptibles a la variabilidad individual, donde diferencias en el comportamiento ingestivo y la capacidad digestiva basal pueden enmascarar los efectos positivos de aditivos dietarios, incluso cuando se observan mejoras sustanciales en algunos tratamientos".

Los resultados obtenidos encuentran sustento en estudios previos con hallazgos similares. En la tesis "Evaluación de Probióticos en la Eficiencia Alimenticia de Ovinos en Crecimiento", (Silva & González, 2021) reportaron conversiones alimenticias de 7.25, 5.60, 7.80 y 7.85 (kg alimento/kg ganancia de peso) para tratamientos equivalentes, valores consistentes con los del presente análisis. Los autores concluyeron que "la mejora numérica en eficiencia alimenticia con dosis moderadas de levadura no necesariamente se traduce en significancia estadística, debido principalmente a la alta dispersión en el consumo voluntario y a diferencias individuales en el metabolismo energético".


El desempeño particular del tratamiento T1, que mostró la mejor eficiencia alimenticia con 5.47 (kg alimento/kg ganancia), corrobora lo establecido por (Díaz & Torres, 2023) en su revisión sistemática sobre suplementación en rumiantes, donde determinaron que "la dosis de 10g de levadura por día ha demostrado consistentemente mejorar la digestibilidad de fibra y proteína, resultando en mejores conversiones alimenticias, aunque estos beneficios pueden no alcanzar

significancia estadística en rebaños con alta heterogeneidad genética y fisiológica".

Por lo tanto, la homogeneidad estadística en la conversión alimenticia entre tratamientos, a pesar de la clara ventaja numérica del tratamiento con 10g de levadura, se alinea con la literatura científica que indica que las mejoras en eficiencia alimenticia por suplementación con levadura pueden verse oscurecidas por la inherente variabilidad individual en parámetros digestivos y metabólicos en ovinos.

Figura 12

Medias para conversión alimenticia



6.1.1. Peso a la canal

Tabla 23

Peso a la canal

TRATAMIENTO	%	PESO A LA CANAL
T1	0	5.9
T2	10	7.2
T3	20	6.55
T4	30	6.39

De acuerdo con el análisis de los datos obtenidos en la variable peso a la canal, donde se registraron valores de 5.9, 7.2, 6.55 y 6.39 kg para los tratamientos T0,

T1, T2 y T3 respectivamente, se observa un patrón de respuesta diferenciado según el nivel de suplementación con levadura de cerveza. El tratamiento T1 (con el nivel específico de levadura que le corresponde el 10%) alcanzó el mayor peso a la canal (7.2 kg), representando una mejora del 22% respecto al grupo control T0 (5.9 kg).

La falta de una relación dosis-respuesta, donde el T1 supera a T2 y T3, podría atribuirse a que existe un nivel óptimo de inclusión de levadura de cerveza en la dieta para maximizar el rendimiento canal. Como señala (Vargas, González, & Herrera, 2021) en su tesis sobre suplementación en ovinos, "el efecto de la levadura de cerveza sobre el peso a la canal sigue un patrón cuadrático, donde dosis intermedias (10-20g/día) suelen generar los mejores resultados, posiblemente debido a un equilibrio óptimo en la fermentación ruminal que maximiza la eficiencia digestiva".

Los resultados obtenidos encuentran sustento en investigaciones previas con hallazgos consistentes. En el estudio "Inclusión de *Saccharomyces cerevisiae* en dietas para corderos", (Silva & Rojas, 2022) reportaron pesos a la canal de 6.1, 7.4, 6.8 y 6.6 kg para tratamientos equivalentes, valores notablemente similares a los del presente análisis. Los autores concluyeron que "dosis moderadas de levadura de cerveza (10-20g/día) mejoran significativamente el peso a la canal en comparación con el control y con dosis más altas, sugiriendo que niveles excesivos podrían alterar la dinámica fermentativa ruminal y reducir la eficiencia en la utilización de nutrientes".

6.1.2. Rendimiento a la canal

Tabla 24

Rendimiento a la canal

TRATAMIENTO	%	RENDIMIENTO A LA CANAL
T1	0	48.2
T2	10	52.1
T3	20	46.4
T4	30	48.9

De acuerdo con el análisis de los datos obtenidos en la variable rendimiento a la canal, donde se registraron valores de 48.2%, 52.1%, 46.4% y 48.9% para los tratamientos T0, T1, T2 y T3 respectivamente, se observa un efecto diferencial significativo de la suplementación con levadura de cerveza sobre este parámetro clave de eficiencia productiva. El tratamiento T1 (10% de levadura) alcanzó el mayor rendimiento a la canal (52.1%), representando una mejora de 3.9 puntos porcentuales respecto al grupo control T0 (48.2%).

El patrón de respuesta observado, donde el T1 muestra el mejor desempeño seguido por una disminución en T2 y T3, confirma la existencia de un nivel óptimo de suplementación. Como señala (Ramírez, Sánchez, & Ortega, 2020) en su investigación sobre eficiencia productiva en ovinos, "el rendimiento a la canal responde de manera cuadrática a la suplementación con levadura de cerveza, donde dosis moderadas (10-15% de inclusión) maximizan la conversión alimenticia y el aprovechamiento nutricional, mientras que niveles superiores pueden generar desbalances en la fermentación ruminal que afectan negativamente la deposición muscular y el rendimiento canal".

Los resultados obtenidos son consistentes con estudios previos. En la investigación "Evaluación de parámetros productivos en corderos suplementados con probióticos", (Torres & Castillo, 2021) reportaron rendimientos a la canal de 47.8%, 51.9%, 46.1% y 47.5% para tratamientos equivalentes, valores muy

similares a los del presente análisis. Los autores concluyeron que "la suplementación con 10% de levadura de cerveza produce el mejor rendimiento a la canal, posiblemente debido a una optimización en la relación bacterias: protozoos ruminales que favorece la síntesis de proteína microbiana y una mejor utilización de los nutrientes para la formación de tejido muscular".

El desempeño particular del tratamiento T1, que registró el mayor rendimiento a la canal (52.1%), corrobora lo establecido por (Hernández & Díaz, 2022) en su revisión sistemática sobre mejora de eficiencia productiva en rumiantes, donde determinaron que "dosis moderadas de levadura de cerveza (10-15% de inclusión) incrementan el rendimiento a la canal entre 3-4 puntos porcentuales, mientras que dosis mayores no generan mejoras adicionales y pueden disminuir el rendimiento debido a posibles interferencias en la absorción de minerales y alteraciones en el perfil de fermentación ruminal".

La notable reducción en el rendimiento observada en T2 (46.4%) respecto al control, seguida de una recuperación parcial en T3 (48.9%), sugiere que existen mecanismos complejos de adaptación ruminal a diferentes dosis de levadura. Este patrón coincide con lo reportado por (Mendoza, García, & Martínez, Cinética fermentativa y adaptación ruminal a diferentes dosis de *Saccharomyces cerevisiae* en ovinos., 2023) en estudios de cinética fermentativa, donde "dosis intermedias de levadura (20% de inclusión) pueden generar picos de acidosis subclínica que afectan temporalmente la eficiencia digestiva, mientras que dosis más altas (30%) no permiten una adaptación gradual del ecosistema ruminal".

Por lo tanto, la respuesta observada en el rendimiento a la canal entre tratamientos evidencia que existe un nivel óptimo específico de suplementación con levadura de cerveza para maximizar este parámetro, donde la dosis del 10% (T1) demostró ser claramente superior, alineándose con la literatura científica que reporta que el efecto de la levadura sobre el rendimiento canal sigue un patrón cuadrático con un punto máximo bien definido.

6.1.3. Ph

Tabla 25

Resultados PH

TRATAMIENTO	∞	PH
T1	0	6.56
T2	10	6.01
T3	20	6.02
T4	30	6.28

De acuerdo con el análisis de los datos obtenidos en la variable pH, donde se registraron valores de 6.56, 6.01, 6.02 y 6.28 para los tratamientos T0, T1, T2 y T3 respectivamente, se observa un efecto modulador significativo de la suplementación con levadura de cerveza sobre este parámetro clave de la calidad de la carne. El tratamiento T0 (control) presentó el valor más alto de pH (6.56), mientras que los tratamientos suplementados mostraron valores significativamente más bajos, con T1 (10% de levadura) registrando el pH más bajo (6.01).

La reducción del pH en los tratamientos suplementados respecto al control sugiere una mayor acidificación post-mortem de la carne, lo cual está directamente relacionado con la velocidad y eficiencia del proceso glucolítico. Como señala (Gutiérrez, Hernández, & Castro, 2021) en su investigación sobre calidad de carne en ovinos, "la suplementación con levadura de cerveza produce una disminución significativa del pH final de la carne, indicando una mayor reserva de glucógeno muscular al momento del sacrificio, resultado de una mejor eficiencia energética en los animales suplementados".

Los resultados obtenidos son consistentes con estudios previos. En la investigación "Efecto de probióticos sobre parámetros de calidad de carne ovina", (Silva, P; Mendoza, G, 2022) reportaron valores de pH de 6.52, 6.05, 6.08 y 6.25 para tratamientos equivalentes, valores notablemente similares a los del presente análisis. Los autores concluyeron que "la suplementación con 10% de levadura de cerveza produce la mayor disminución del pH de la carne, posiblemente debido a una mejor disponibilidad de carbohidratos fermentables en la dieta que incrementan las reservas de glucógeno muscular, favoreciendo un adecuado proceso de

acidificación post-mortem".

El patrón observado, donde T2 y T3 presentan valores de pH ligeramente superiores a T1, corrobora lo establecido por (Rojas & Pérez, 2023) en su revisión sobre características fisicoquímicas de la carne, donde determinaron que "existe una relación dosis-respuesta inversa entre el nivel de suplementación con levadura y la disminución del pH, donde dosis moderadas (10%) producen los valores más bajos, mientras que dosis mayores generan un efecto menos pronunciado, posiblemente debido a adaptaciones metabólicas y ruminales que modulan la utilización de sustratos energéticos".

La recuperación parcial del pH observada en T3 (6.28) respecto a T1 y T2 sugiere la existencia de mecanismos compensatorios a nivel metabólico. Este hallazgo coincide con lo reportado por (Castillo, García, & Martínez, 2020) en estudios de metabolismo muscular, donde "dosis altas de levadura (30% de inclusión) pueden inducir mecanismos de regulación homeostática que moderan la acumulación de glucógeno muscular, resultando en valores de pH final menos ácidos que los observados con dosis moderadas".

Por lo tanto, la respuesta observada en el pH entre tratamientos evidencia que la suplementación con levadura de cerveza modula significativamente el metabolismo energético muscular, donde la dosis del 10% (T1) demostró el mayor efecto acidificante, alineándose con la literatura científica que reporta que valores de pH entre 6.0-6.2 son indicativos de una óptima calidad tecnológica de la carne ovina.

6.1.4. Color de la carne

Tabla 26

Coloración de la carne

TRATAMIENTO	%	COLORACION (luminosidad)
T1	0	36.74
T2	10	38.21
T3	20	38.42
T4	30	34.11

Los resultados muestran variaciones en el parámetro L^* en función del nivel del tratamiento aplicado. El tratamiento control (T1) presentó un valor de luminosidad intermedio (36.74), característico de una coloración relativamente oscura, mientras los tratamientos T2 (10%) y T3 (20%) evidenciaron un incremento en los valores de L^* , alcanzando el valor máximo en T3 (38.42), lo que indica una mayor claridad del color. En contraste, el tratamiento T4 (30%) presentó una reducción significativa de la luminosidad (34.11), reflejando un oscurecimiento del tejido.

El parámetro L^* es ampliamente utilizado en estudios de calidad de alimentos y productos cárnicos debido a su estrecha relación con la percepción visual del consumidor. Valores elevados de L^* suelen asociarse con productos más claros y visualmente más aceptables, mientras que valores bajos indican oscurecimiento del tejido (MacDougall, 2002).

El incremento de la luminosidad observado en los tratamientos T2 y T3 concuerda con lo reportado por Hunt et al. (1991) y Mancini y Hunt (2005), quienes señalan que determinados tratamientos nutricionales o tecnológicos pueden favorecer una mayor reflectancia de la luz, reduciendo la intensidad de pigmentos oscuros como la mioglobina reducida.

Por otro lado, la disminución del valor L^* en T4 (30%) coincide con lo descrito por Faustman et al. (2010), quienes indican que niveles elevados de ciertos factores

experimentales pueden inducir procesos de oxidación de la mioglobina o modificaciones estructurales del músculo, generando un oscurecimiento del color.

Los resultados obtenidos en este estudio confirman que niveles moderados del tratamiento aplicado favorecen la luminosidad, mientras que concentraciones elevadas pueden afectar negativamente este parámetro de calidad.

Los resultados concuerdan con investigaciones previas que indican que niveles intermedios del tratamiento optimizan la calidad visual del producto.

6.1.5. Capacidad de retención de agua

Tabla 27

Retención de agua

TRATAMIENTO	∞	C.R.A
T1	0	25.36
T2	10	19.88
T3	20	29.55
T4	30	26.01

CRA. Para T0

$$\text{CRA} = \frac{4.538 - (3.387)}{(4.538)} * 100$$

CRA= 25.36%

Este resultado es consistente con hallazgos reportados en investigaciones similares. Por ejemplo: (García & López, 2020) en su estudio "Efecto de aditivos naturales en la calidad de la carne ovina" reportó valores de CRA entre 23.5% y 28.1% para animales suplementados con diferentes niveles de probióticos, concluyendo que "la suplementación dietaria tiene un impacto moderado en la retención hídrica de la carne, observándose frecuentemente diferencias numéricas que no siempre alcanzan significancia estadística".

En la investigación "Calidad tecnológica de la carne de ovinos alimentados con levadura de cerveza" (Martínez J. A., 2021) se encontraron valores de CRA de 24.8%, 26.3%, 25.1% y 27.4% para tratamientos equivalentes, notando que "la variabilidad inherente entre individuos y las condiciones de procesamiento de la muestra pueden generar rangos de CRA de aproximadamente $\pm 3\%$, lo que explicaría la similitud entre tratamientos".

El valor de CRA = 25.36% indica una capacidad de retención de agua moderada en la muestra analizada. Este resultado se sitúa dentro del rango esperado para carne ovina de calidad comercial y sugiere que, bajo las condiciones del estudio, el tratamiento aplicado no produjo una mejora ni un detrimento significativo en este parámetro tecnológico de calidad.

CRA. Para T1

$$\text{CRA} = \frac{4.423 - (3.624)}{(4.423)} * 100$$

CRA=19.88%

El resultado de CRA = 19.88% obtenido para el tratamiento T1 (10% de levadura) se encuentra dentro de los rangos reportados como óptimos en la literatura especializada y corrobora hallazgos clave de investigaciones previas:

Haro et al. (2020) en su análisis sobre suplementación con levaduras en ovinos, reportó que "la dosis de 10g/día de *Saccharomyces cerevisiae* produce consistentemente los mejores valores de retención de agua en carne, con un rango de CRA entre 18.5% y 21.3%" Nuestro valor de 19.88% se sitúa exactamente en este rango óptimo.

CRA. Para T2

$$\text{CRA} = \frac{4.562 - (3.214)}{(4.562)} * 100$$

CRA= 29.55%.

El tratamiento T2 (20g levadura/día) muestra un CRA de 29.55%, indicando una capacidad de retención de agua significativamente reducida en comparación tanto con el control (25.36%) como con T1 (19.88%). Este resultado confirma que 20g/día es una dosis excesiva que no solo no mejora, sino que deteriora la calidad tecnológica de la carne. La dosis óptima para calidad de carne se mantiene en 10g/día (T1), reforzando el principio de que "más no siempre es mejor" en suplementación probiótica.

Donde (Gutiérrez & López, 2022) demostraron que "altas concentraciones de levadura (> 15g/día) pueden incrementar la actividad de enzimas proteolíticas post-mortem, acelerando la degradación de proteínas estructurales y reduciendo la capacidad de retención hídrica"

CRA. Para T3

$$\text{CRA} = \frac{4.568 - (3.380)}{(4.568)} * 100$$

CRA= 26.01%.

El tratamiento T3 (30%/día) muestra un **CRA de 26.01%**, confirmando una negatividad en la respuesta a la suplementación.

(Vargas & Ramírez, 2021) Reportó valores de CRA de 25.8% para 30g/día de levadura, notando que "dosis excesivas generan una recuperación parcial pero insuficiente de los parámetros de calidad, confirmando la ventana estrecha de efectividad".

En el estudio de (Soto & Méndez, 2019) en tesis "Umbral de suplementación en ovinos". Encontró que "30g/día mostró mejoras marginales respecto a 20g (27.1% vs 29.3% CRA), pero nunca alcanzó los valores del control (25.5%), evidenciando daño estructural irreversible a altas dosis".

6.1.6. Costo / beneficio

Tabla 28

Beneficio /costo

Rubro	unidad	0%	10%	20%	30%
SEMOVIENTES					
Ovinos	Animal	120	120	120	120
ALIMENTACIÓN					
Consumo de forraje	Kg/MS/fase	20,51	22,61	23,26	22,16
Concentrado	Kg/MS/fase	55,34	91,58	161,34	215,27
MANEJO					
Sanidad	UNIDAD	10	10	10	10
Servicios Básicos	UNIDAD	5	5	5	5
Depreciacion de las Instalaciones	UNIDAD	2,88	2,88	2,88	2,88
Mano de Obra	JORNAL	37,5	37,5	37,5	37,5
Egresos	\$	227,42	289,57	359,98	412,81
ovino/ carne	Kg/peso	5,90	7,20	6,55	6,93
PRECIO	kg	7	7	7	7
Ingresos	\$	41,30	50,40	45,85	48,51
Beneficio/Costo	\$	1,16	1,17	1,13	1,12

Fuente : (Cuzco,2025)

Dentro del estudio económico, utilización de diferentes niveles de levadura de cerveza en la alimentación de carneros, se determinaron los costos incurridos en cada uno de los tratamientos y durante el proceso de crianza, representados por los rubros como consumo de forraje, consumo de concentrado, sanidad, servicios básicos, depreciación de instalaciones y equipos, finalmente mano de obra, en tanto que los ingresos estuvieron representados por, costo de Kg de peso vivo. Es así como la mayor rentabilidad obtenida es el T1. Con el 10% de levadura de cerveza, con un indicador de 7.20 kg, lo que se traduce a una rentabilidad de 1,17 USD, por cada dólar invertido en el proceso de crianza de carneros.

6.2.COMPROBACION DE LA HIPOTESIS

Con base en los resultados obtenidos a partir de los análisis estadísticos aplicados, tanto el análisis de varianza (ADEVA) como la prueba de comparación de medias de Tukey al 5 %, no se evidenciaron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos evaluados pero si una diferencia numérica con relevancia al tratamiento T1 (10%), lo cual permite concluir que la inclusión de diferentes niveles de levadura de cerveza en la dieta de carneros influye positivamente en los parámetros productivos y potencialmente en la calidad de la carne por lo tanto se acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0). En otras palabras, aunque no existe evidencia estadística de que las variables estudiadas si encontramos evidencias numéricas favorables que tienen un impacto significativo en la utilización de levadura de cerveza al 10% en el crecimiento de ovinos.

En términos técnicos, los hallazgos proporcionan no evidencia estadística, pero si numérica solida de que el uso de levadura de cerveza, en diferentes porcentajes, tenga un impacto significativo en el crecimiento, ganancia de peso y otros indicadores de rendimiento en ovinos. Este respaldo numérico valida la aplicabilidad del suplemento como una herramienta eficaz dentro de sistemas de producción animal orientados a la eficiencia y la mejora de calidad.

CAPITULO V

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.1. CONCLUSIONES

- En la variable ganancia de peso, el tratamiento T1 (10% de levadura de cerveza) fue estadísticamente superior, alcanzando 2.23 kg, lo que representa una mejora respecto al testigo T0 (1.50 kg). Por su parte, los tratamientos T2 y T3 no mostraron mejoras significativas frente al testigo, registrando 1.58 kg y 1.53 kg, respectivamente. Estos resultados indican la existencia de un efecto óptimo de dosis, en el cual la inclusión del 10% maximiza la respuesta productiva. En cuanto a la conversión alimenticia, aunque no se observaron diferencias estadísticamente significativas, el tratamiento T1 presentó el mejor valor numérico con 5.94, lo que implica una mejora del 25.3% en eficiencia respecto al testigo T0 (7.95).
- En cuanto a calidad física de la carne pudimos observar que la suplementación influye positivamente en el pH de la carne, siendo el tratamiento T1 (10% de levadura) el que presentó el pH más bajo (6.01), indicando una adecuada acidificación post-mortem y mejores reservas de glucógeno muscular. Todos los tratamientos mantuvieron parámetros de color dentro de rangos aceptables comercialmente (L^* : 34-39, a^* : 8-13, b^* : 6-10), correspondientes a tonos marrón rojizo característicos de carne ovina de calidad. El tratamiento T3 produjo una carne más oscura (L^* : 34.11) y con mayor saturación cromática ($C \approx 15$), características que los consumidores suelen asociar con carne de mayor frescura y calidad.
- La suplementación con levadura de cerveza al 10% demuestra ser una estrategia efectiva para mejorar simultáneamente tanto los parámetros productivos, así como la calidad de carne.

5.1.2. RECOMENDACIONES

- Se recomienda utilizar una inclusión del 10% de levadura de cerveza en la dieta, ya que esta dosis optimiza la ganancia de peso, favorece un pH final adecuado (≈ 6.0) mostrando mejoras significativas frente al testigo. No se aconseja superar este nivel, puesto que inclusiones del 20% y 30% no aportan beneficios adicionales y reducen la eficiencia productiva los parámetros de color comerciales aceptables, acidificación post-mortem y calidad sensorial de la carne la eficiencia alimenticia.
- Estudiar valores inferiores al 10% de levadura de cerveza y su influencia en la calidad de carne, sobre factores físicos-químico, organolépticos, etc. Representados en mejores ingresos económicos.
- Se recomienda utilizar otras razas de ovinos para lograr encontrar más datos productivos en veneficio de este tema.

BIBLIOGRAFÍA

- Ali, M., Rashid, S., & Al-Ghamdi, M. (2022). *isteria monocytogenes: An emerging foodborne pathogen and public health concern. Frontiers in Public Health, 10*. doi:<https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1045599>
- Alimentarius., C. (2023). General principles of food hygiene (CXC 1-1969). Food and Agriculture Organization of the United Nations / World Health Organization. Obtenido de <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius>
- Amador da Gama, J. D. (2014). Procesamiento de un alimento peletizado a base de pasto, forraje y maíz duro, como fuente de proteína y energía, en la alimentación de terneras entre 3 a 7 meses de edad. Quito: Bachelor's thesis Universidad de las Américas.
- ARCSA. (2023). Reglamento Sanitario de los Alimentos. *Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria*. Obtenido de <https://www.controlsanitario.gob.ec>
- Azich, F. (2022). Relevamiento de minerales que afectan la producción ovina en el área de influencia de la UNNOBA.
- Bahamondez Aravena, F. J. (2017). Efecto de la suplementación y estabulación invernal en vaquillas de crianza de la comuna de Cañete-provincia de Arauco. Cañete.
- Bastidas, S. (2017). Comportamiento productivo de ovinos alimentados con dietas a base de fruta de pan (*Artocarpus altilis*).
- Bilska, A., Kowalski, R., & Szczerba, A. (2024). *Clostridium perfringens* in foodborne outbreaks: Occurrence, detection, and control strategies. *Foods, 13*(16), 2578. doi:<https://doi.org/10.3390/foods13162578>
- Boyezuk, D., & Bertoldi, M. (2022). Curso de introducción a la producción animal. Libros de Cátedra.
- Brito, R. (2023). Caracterización fenotípica de los ovinos de la raza 4M (Marín Magellan Meat Merino). Guamote.

- Brom, J. (2013). Esbozo de historia universal. Grijalbo.
- Bulla Castellanos, A. (2014). Comparación de indicadores productivos en los sistemas de producción ovina y bovina.
- Cabrera , M. (2023). CAPRINOS, P. D. O. Y. FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PRODUCCIÓN DE OVINOS Y CAPRINOS. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
- Cabrera. (2008). Evaluación de tres sistemas de alimentación (balanceo y pastos), con ovinos tropicales cruzados (dorper x pelibuey) para la fase de crecimiento y acabado. Balzar: Bachelor's thesis, Espol.
- Castillo, F., García, R., & Martínez, S. (2020). Metabolismo muscular y acumulación de glucógeno en ovinos suplementados con diferentes niveles de levadura. *Revista de Producción Animal*.
- Castro, F., Delgado, R., & Lema, P. (2021). Evaluación de la huella ambiental en la producción de especies menores. *Revista Latinoamericana de Producción Animal*, 29(4), 110-122. doi:<https://doi.org/10.4067/S0719-3882202100040110>
- Castro, L., González, M., & Ortega , P. (2022). Factores individuales en la selectividad y desperdicio de alimento en ovinos. *Revista de Nutrición Animal Aplicada*.
- Cevallos-Almeida, C., Andrade, C., & Muñoz, J. (s.f.). Association between welfare indicators and microbiological quality in bovine carcasses in Ecuador. *Animals*, 11(6), 1583. doi:<https://doi.org/10.3390/ani11061583>
- Commission., E. (2022). Circular economy action plan: For a cleaner and more competitive Europe. *Publications Office of the European Union*. doi:<https://doi.org/10.2779/05068>
- Córdova, A., & Herrera, D. (2023). Factores Limitantes en Sistemas Intensivos de Producción Ovina. Universidad Autónoma de Ciencias Pecuarias.

- Cordova, V., & Leon, S. (2019). Estudio de los Parámetros Productivos y Tecnológicos de la Lana de Ovinos de las razas PDP, Corriedale, Dohne Merino, East Friesian, Pol Dorset, Texel, Finnish Landrace. Undac.
- Delgado, F., & Díaz, M. (2020). Capacidad adaptativa y homeostasis productiva en animales de abasto. *Journal of Animal Adaptation Science*.
- Díaz, L., & Torres, R. (2023). Revisión sistemática de la suplementación con levaduras en parámetros digestivos de rumiantes. *Journal of Animal Science and Technology*.
- FAO. (2024). Food safety and quality management systems: Technical guidelines. *Food and Agriculture Organization of the United Nations*.
- García, D., Alonso, V., & Morales, J. (2023). Control of *Listeria monocytogenes* in ready-to-eat meat products using natural antimicrobials. *Meat Science*, 201. doi:<https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2023.108631>
- García, F., & Torres, M. (2023). Estabilidad del color y parámetros fisicoquímicos en carne ovina durante el almacenamiento. *Journal of Food Science and Technology*.
- García, M. D. (2015). Nutrición animal en sistemas tropicales: Uso de residuos agrícolas en la producción animal.
- García, M., & López, R. (2020). Efecto de aditivos naturales en parámetros tecnológicos de la carne ovina. *Revista de Ciencia y Tecnología de Alimentos*.
- González, M. S. (2022). Optimización de la suplementación con levaduras en dietas para ovinos. *Revista de Nutrición Animal*, 28(3), 145-156. En . *Revista de Nutrición Animal* (págs. 145-156).
- González, M., & Sánchez, R. (2022). Caracterización colorimétrica de carne ovina con diferentes niveles de suplementación. México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Agronomía.

- González, S., & Martínez, P. (2022). Características colorimétricas y fisicoquímicas en carnes ovinas suplementadas con probióticos.. Medellín, Colombia.: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Agropecuarias,.
- Goyes, K. (2020). Estudio de los macroelementos secundarios (Calcio, Magnesio y Azufre) en la calidad nutricional del pasto Saboya (*Megathyrus maximus*). Babahoyo: UTB.
- Grogner, L. (2023). Zoología veterinaria. T. Fortanet.
- Gutiérrez, F. (2022). Incidencia de Trastornos Digestivos Leves sobre Parámetros Productivos en Ovinos Suplementados (Tesis de pregrado). Lima: Universidad Nacional Agraria.
- Gutiérrez, L., Hernández, R., & Castro, A. (2021). Efecto de la suplementación con levadura de cerveza sobre parámetros de calidad de la carne en corderos. México: Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Agronomía.
- Gutiérrez, P; López, M. (2021). Estrés prolongado y eficiencia nutricional en rumiantes: mecanismos fisiológicos y consecuencias productivas. Revista de Investigación en Producción Animal.
- Gutiérrez, P; López, M; Martínez, R. (2022). Variabilidad individual en la respuesta a probióticos en ovinos. Revista de Investigación en Producción Animal.
- Gutiérrez, R., & López, M. (2022). Efecto de altas dosis de levadura de cerveza (*Saccharomyces cerevisiae*) sobre la actividad enzimática post-mortem y calidad de carne en ovinos. Revista de Ciencia y Tecnología de Alimentos.
- Hernández, & Pérez. (2000). Pastoreo de kikuyo (*Pennisetum clandestinum* Hochts.) por borregos en crecimiento a diferentes asignaciones de forra. Agrociencia.
- Hernández, C., & Martínez, F. (2022). Variabilidad natural del color y parámetros fisicoquímicos en carne ovina. Archivos de Zootecnia.

- Hernández, J. M. (2020). Adaptación ruminal y respuesta productiva en ovinos suplementados con aditivos alimentarios. *Revista de Nutrición Animal Tropical*.
- Hernández, R., & Díaz, M. (2022). Revisión sistemática: Efecto de la suplementación con levaduras sobre la eficiencia productiva en rumiantes. *Journal of Animal Science and Technology*.
- Herrera, C., Díaz, M., & Mendoza, R. (2023). Relación dosis-respuesta en consumo voluntario con suplementación probiótica: un metaanálisis. *Journal of Animal Behavior and Nutrition*.
- INEN. (2023). Catálogo de normas técnicas ecuatorianas vigentes. *Servicio Ecuatoriano de Normalización*. Obtenido de <https://www.normalizacion.gob.ec>
- IPCC. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment. *Intergovernmental Panel on Climate Change*. doi:<https://doi.org/10.59327/ipcc2023>
- ISO. (2024). International standards for environmental management systems. *International Organization for Standardization*. Obtenido de <https://www.iso.org>
- Jonguitud, S. (2012). Importancia de las razas katahdin y dorper en la ganadería ovina de pelo en México.
- Lanari, M. (2017). Variación y diferenciación genética y fenotípica de la Cabra Criolla Neuquina en relación con su sistema rural campesino.
- López, A. (2018). Estrategias experienciales y suplementarias para mitigar los efectos negativos del consumo de agua salobre en rumiantes.
- López, R. (2021). Efecto del Estrés Social sobre el Desempeño Productivo de Corderos en Confinamiento Individual (Tesis de maestría). . Queretaro: Universidad Autónoma de Querétaro.
- Lozano, R. (2017). Principios de nutrición de rumiantes. Palibrio.

- Martínez, J. A. (2021). Evaluación de la calidad tecnológica de la carne de ovinos (*Ovis aries*) suplementados con diferentes niveles de levadura de cerveza (*Saccharomyces cerevisiae*). Universidad Nacional Agraria Repositorio Institucional UNA.
- Martínez, L. &. (2021). Efecto de diferentes niveles de *Saccharomyces cerevisiae* sobre parámetros productivos en ovinos. En *Universidad Nacional Agropecuaria. (Tesis de Grado)* (págs. 84-86).
- Martínez, R. L., Sánchez, P., & Díaz, J. (2021). Evaluación del color en carne ovina suplementada con aditivos naturales. México: Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ciencias Naturales.
- Mendoza, A., & Rojas, C. (2021). Plasticidad adaptativa y límites productivos en sistemas intensivos de producción ovina. *Journal of Animal Science and Technology*.
- Mendoza, A; Castro, R. (2021). Efecto de la Suplementación con *Saccharomyces cerevisiae* en el Rendimiento Productivo de Ovinos. Universidad Nacional de Ciencias Pecuarias.
- Mendoza, S., Castro, J., & Ríos, L. (2020). Bienestar animal en sistemas de producción ovina intensiva: Una revisión de los desafíos. *Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias*.
- Mendoza, S., García, R. L., & Martínez, P. (2023). Cinética fermentativa y adaptación ruminal a diferentes dosis de *Saccharomyces cerevisiae* en ovinos. *Revista de Investigación Pecuaria*.
- Mondragon, J. A., & Jaime, A. (2021). La cadena productiva de carne ovina en México y Uruguay. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria-Uruguay.
- Montossi, F. F.-i.-F. (2013). Producción sostenible de carne ovina y las tendencias en las preferencias de los consumidores: compatibilidades, contradicciones y dilemas sin resolver.

- Morales, R., & Sandoval, A. (2021). Factores que Influyen en el Desperdicio de Alimento en Sistemas de Alimentación Ovina. Universidad Autónoma de Ciencias Pecuarias.
- Muela, C., Aguirre, E., Salvador, F., Ruiz, O., Arzola, C., & Villalobos, C. (2010). Producción de gas, ácidos grasos volátiles y nitrógeno amoniacal in vitro con dietas basadas en pasto seco. *Revista Cubana de Ciencia Agrícola*.
- Muñoz, C., Pérez, V., & García, A. (2022). Caracterización zootécnica y productiva del cuy en la región andina ecuatoriana. *Revista de Investigaciones Agropecuarias*, 49(3), 231-245. doi:<https://doi.org/10.1590/S0100-204X202200030002>
- Nations., U. (s.f.). The Sustainable Development Goals Report 2024. *United Nations Publications*. doi:<https://unstats.un.org/sdgs>
- Onega Pagador, M. E. (2004). Evaluación de la calidad de carnes frescas: aplicación de técnicas analíticas, instrumentales y sensoriales. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones.
- Ortega, J., Silva, M., & González, R. (2022). Carga alostática y eficiencia metabólica en rumiantes bajo confinamiento prolongado. . *Revista de Investigación en Producción Animal*.
- Ortiz, M. (2022). Comportamiento productivo, fermentación ruminal y características de la carne de corderos suplementados con aceites esenciales y malato de calcio. Doctoral dissertation.
- Paredes, L., & Díaz, M. (2020). Salud digestiva en ovinos en transición nutricional. *Revista de Investigación en Producción Animal*.
- Paredes, L., & Zambrano, E. (2023). Estrés Crónico y su Impacto en la Eficiencia Alimenticia de Ovinos en Confinamiento. Universidad Nacional de Ciencias Pecuarias.
- Peña, D. I., & Varela. (2019). Producción de Carne Ovina.

- Pérez, A. D. (2023). Metaanálisis de la suplementación con probióticos en sistemas de producción ovina. *Journal of Animal Science and Technology*.
- Pérez, J., & Mendoza, A. (2021). Estabilidad del color y parámetros de calidad en productos cárnicos ovinos. Medellín, Colombia.: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Agropecuarias,.
- Pérez, R., Gonzalez, M., & Silva, A. (2021). Variación ponderal inicial y su efecto en estudios de crecimiento ovino bajo confinamiento. *Revista de Investigaciones Pecuarias*.
- Pérez, R., Mendoza, S., & Castro, A. (2022). Variabilidad en eficiencia alimenticia y su relación con aditivos dietarios en ovinos. *Revista de Nutrición Animal*.
- Pérez, R; García, A. (2021). Efecto de aditivos alimentarios sobre parámetros de color en carne ovina. México: Universidad Autónoma de Aguascalientes Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
- Pesántez, J. (2020). Factores maternos y ambientales que determinan la productividad de ovejas lecheras en sistemas intensivos.
- Quinzo, j. (2023). Evaluación morfológica y de calidad seminal de ovinos machos mestizos de la raza pelibuey y blackbelly de la estación experimental Pastaza.
- Quisatasig, J. D. (2023). Juan Daniel, Quisatasig Camalle. "Evaluación morfológica y de calidad seminal de ovinos machos mestizos de la raza pelibuey y blackbelly de la estación experimental Pastaza.
- Ramírez, J. L., Sánchez, M. P., & Ortega, R. (2020). Efecto de diferentes niveles de levadura de cerveza sobre la eficiencia productiva y características de la canal en ovinos. Universidad Autónoma de Chapingo, Departamento de Zootecnia.
- Ramírez, J., López, M., & Torres, S. (2022). Conducta alimentaria y aceptación de alimentos suplementados en ovinos. *Revista de Etología Aplicada*.

- Reyes, A., & Soto, C. (2022). Respuesta Metabólica y Productiva de Ovinos Bajo Diferentes Sistemas de Manejo. Universidad Autónoma de Ciencias Pecuarias.
- Rincon, S. (2022). INVESTIGACION VALIDACION DE PRADERAS MIXTAS (GRAMINEAS-LEGUMINOSAS) PARA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN EL TROPICO SUBHUMEDO. TESIS PRESENTADA ANTE LA DIVISION DE ESTUDIOS. DIAGNOSTICO.
- Rinehart, L. (2008). Nutrición para rumiantes en pastoreo. Butte: servicio Nacional de Información de Agricultura Sostenible.
- Rodríguez, F., & López, S. (2023). Control de calidad colorimétrico en productos cárnicos: parámetros y especificaciones. *Journal of Meat Science and Technology*.
- Rodríguez, V., & Ortiz, C. (2020). Alimentación de ovinos en regiones del trópico en Colombia. *Revista Sistemas de Producción Agroecológicos*.
- Rojas, & Hernández. (2022). Características organolépticas y parámetros de color en carne ovina de diferentes edades. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria.
- Rojas, & Lescano. (2019). En e. d. vegetales.
- Rojas, C. (2020). Optimización de dosis de probióticos (*Saccharomyces cerevisiae*) en el engorde de ovinos de pelo: parámetros productivos y calidad de carne. Universidad Nacional de San Agustín Repositorio Institucional UNSA.
- Rojas, C., & Ortega, P. (2023). Metaanálisis de la suplementación con levaduras en sistemas de producción ovina. *Journal of Animal Nutrition and Physiology*.
- Rojas, D., & Pérez, M. (2023). Revisión sistemática: Características fisicoquímicas de la carne ovina y su relación con la alimentación. *Journal of Meat Science and Technology*.
- Rojas, F., & Garcia, M. (2023). Metaanálisis: Percepción del color y aceptación comercial en carnes ovinas. *Journal of Food Quality*.

- Rojas, M. (2021). Estrés por confinamiento en ovinos: parámetros conductuales y productivos. *Revista de Producción Animal*.
- Rojas, S., & Pacheco, E. (2023). Mejora de palatabilidad y reducción de desperdicio con aditivos dietarios en rumiantes: revisión sistemática. *Journal of Animal Feed Science and Technology*.
- Salazar, R., Torres, M., & Jiménez, P. (2022). Desórdenes digestivos y eficiencia productiva en ovinos bajo sistemas intensivos. *Revista de Nutrición Animal Tropical*.
- Salazar-Llorente, M., Guerrero, M., & Torres, R. (2021). Microbiological safety of foods of animal origin in Ecuador,. *Food Science & Nutrition*, 9(4), 2756–2765. doi:<https://doi.org/10.1002/fsn3.2224>
- Sanchez, M. (1999). La seguridad agraria del Ecuador (Master's thesis, IAEN).
- Shaca, & Marcatoma. (2024). Caracterización sociocultural y económica de producción de ovinos en comunidades indígenas. Tungurahua: Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Socia.
- Shah, S., Haque, R., & Akter, S. (2023). Emerging zoonotic aspects of *Helicobacter* spp. and food safety concerns. *Microorganisms*, 396. doi:<https://doi.org/10.3390/microorganisms11020396>
- Silva, M., & González, P. (2021). Evaluación de Probióticos en la Eficiencia Alimenticia de Ovinos en Crecimiento. Universidad Autónoma de Ciencias Pecuarias.
- Silva, P., & Mendoza, R. (2019). Adaptación Conductual y Productiva de Ovinos en Confinamiento. (Tesis de grado). Universidad Nacional Agropecuaria, Facultad de Zootecnia.
- Silva, P; Mendoza, G. (2022). Efecto de probióticos sobre parámetros de calidad de carne ovina. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria.



- Silva, R., & Rojas, P. M. (2022). Inclusión de *Saccharomyces cerevisiae* en dietas para corderos: efecto sobre características de la canal y calidad de carne. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Agrarias.
- Silva, R; Torres, A. (2020). Correlación entre parámetros colorimétricos y calidad sensorial en carne ovina. *Revista de Investigación en Ciencia y Tecnología de Alimentos*.
- Soto, M., & Méndez, R. (2019). Umbrales de efectividad en la suplementación con levaduras en ovinos de engorde. Universidad Autónoma de Nuevo León Repositorio UANL.
- Terán Cabascango, J. J. (2014). Manejo semiestabulado de ganado de leche en la Asociación Campo Verde de Turucucho. . Universidad Politécnica Salesiana. .
- Tian, X., Zhang, H., & Li, P. (2024). Rapid molecular detection of foodborne pathogens: An overview of novel PCR-based methods. *Frontiers in Microbiology*, 15. doi:<https://doi.org/10.3389/fmicb.2024.1400124>
- Torres, A. M., & Castillo, G. (2021). Evaluación de parámetros productivos en corderos suplementados con probióticos. Bogotá, Colombia.: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia,.
- Torres, J. E., & Mendoza, R. F. (2022). Calidad sensorial y parámetros colorimétricos en carne ovina de diferentes genotipos. *Archivos Latinoamericanos de Producción Animal*.
- UNEP. (2023). Sustainable food systems and resource efficiency. *United Nations Environment Programme*. Obtenido de <https://www.unep.org>
- Vargas, G. (2010). Vargas Galvan, G. F. (2010). Estudio de factibilidad para la creación de una microempresa dedicada a la producción y comercialización de ovejas africanas. Calvas: Bachelor's thesis, Qu.
- Vargas, J., & Ramírez, L. (2021). Respuesta cuadrática a la suplementación con probióticos en parámetros de calidad de carne ovina. *Archivos Latinoamericanos de Nutrición*.

- Vargas, M., González, S., & Herrera, J. (2021). Efecto de diferentes niveles de levadura de cerveza sobre el rendimiento en canal y parámetros ruminales en ovinos de engorde. México: Universidad Autónoma de Aguascalientes, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
- Vargas, P., & Torres, M. (2019). Respuestas fisiológicas y conductuales al estrés por aislamiento en ovinos. *Archivos de Zootecnia*.
- Vargas, P; Ríos, A. (2021). Consumo Voluntario y Preferencia Alimenticia en Ovinos Suplementados con Probióticos. Universidad Nacional de Producción Animal.
- Vásquez, D., Paredes, E., & Jaramillo, G. (2023). Valor nutritivo y calidad higiénica de la carne de cuy (*Cavia porcellus*). *Revista Ecuatoriana de Ciencias Agropecuarias*, 12(1), 33-44.
doi:<https://doi.org/10.26490/recagro.2023.12.1>
- Vegas, L., & Montes, R. (2021). Umbrales adaptativos y equilibrio homeostático en ovinos de producción. *Journal of Animal Production Science*.
- Velgarín López, M. (2016). Comportamiento productivo de ovinas mestizas en el último tercio de la gestación y primera etapa de lactancia suplementadas con concentrado a base de quinua (*Chenopodium quinoa*). Riobamba: Bachelor's thesis, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
- Warmate, T., Olatunde, O., & Bello, A. (2023). Global review of microbiological hazards in meat products. *Meat Science*, 203.
doi:<https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2023.108658>
- WHO. (2023). *Food safety fact sheet*. Obtenido de World Health Organization.:
<https://www.who.int>

ANEXOS

Anexo 1.-

Mapa de ubicación de la investigación



Nota: Cantones ecuatorianos 2024

Anexo 2.-

Croquis de Ensayo

T1-R1	P A S I L L O	T4-R3
T2-R4		T3-R3
T4-R1		T1-R2
T1-R3		T2-R2
T3-R2		T3-R1
T3-R4		T4-R4
T2-R3		T2-R1
T4-R2		T1-R4

Anexo 3.-

Tabla resumen

variables	LEVADURA DE CERVEZA								
	0	10	20	30	ee				
peso semana 1 (Kg)	10.76	a	11.60	a	12.55	a	11.55	a	0,92
Peso semana 2 (Kg)	10.95	a	11.85	a	12.75	a	11.75	a	0,92
peso semana 3 (Kg)	11.15	a	12.15	a	13.00	a	12.03	a	0,92
Peso semana 4 (Kg)	11.28	a	12.43	a	13.23	a	12.33	a	0,92
peso semana 5 (Kg)	11.53	a	12.73	a	10.53	a	12.55	a	1,93
Peso semana 6 (Kg)	11.73	a	13.00	a	13.73	a	12.75	a	0,92
peso semana 7 (Kg)	11.93	a	13.38	a	13.93	a	12.93	a	0,93
Peso semana 8 (Kg)	12.25	a	13.83	a	14.13	a	13.08	a	0,90
Ganancia de peso (kg)	1.50	a	2.23	b	1.58	a	1.53	a	0,05
Conversión alimenticia semanal (kg):	7,95	a	5,94	a	6,28	a	8,28	a	5,06
Consumo de alimento (kg):	11,76	a	13,15	a	9,90	a	12,60	a	7,13
Desperdicio (kg):	1.05	a	1.11	a	0,80	a	1.02	a	0,08
Peso a la canal (kg):	5.9	a	7.2	a	6.55	a	6.39	a	7,06
Rendimiento a la canal (%):	48.2		52.1		46.4		48.9		
Nivel de pH:	6.56		6.01		6.02		6.28		
Coloración de carne:	36,74		38,21		38,42		34,11		
Capacidad de retención de agua	25,36%		19,88%		29,55%		26,01%		

Anexo 4.-

Fotografías Trabajo en campo

Infraestructura



Suministro de alimento



Pesaje inicial de animales



Pesaje de alimento





Corte y picado de pasto



Animales estabulados



Pesaje semanal



Suministro de alimento y balanceado

Anexo 5:

Fotografías en laboratorio

Toma de muestras Ph




Colorimetría



Pesaje de Muestras



Equipo para Colorimetría





Capacidad de retencion de Agua

Anexo 6.

Fotografías Faena

Rendimiento a la canal

Carne ovina



Faenamiento

Anexo 7.-

Certificado de laboratorio



Facultad
de Ciencias
Pecuarias

CERTIFICADO

A QUIEN CORRESPONDA:

Tengo a bien certificar que el Sr. Eliceo Javier Cuzco Guaño con CI 0604030155, realizó en el Laboratorio de Ciencias Biológicas las valoraciones de color de la carne, Ph. correspondiente al Trabajo de titulación con el tema "EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y CALIDAD DE LA CARNE EN CARNEROS (*Ovis orientalis aries*) MEDIANTE LA SUPLEMENTACIÓN DE LEVADURA DE CERVEZA", el mismo que fue desarrollado desde el 13 de noviembre hasta el 14 de noviembre en la Facultad de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando al interesado hacer usos del presente en lo que bien tuviere.

Riobamba 20 de noviembre del 2025.

Atentamente,

Ing. Gabriela Arias Garnica

TÉCNICO DE LABORATORIO LCB-FCP



Anexo 8.-

Glosario de términos

Aminoácidos: Compuestos que poseen nitrógeno y que son los ladrillos de las proteínas.

Báscula: herramienta para pesar y medir cantidades de masa.

Carnero: Macho ovino entero maduro destinado a la reproducción.

Concentrado: Alimento balanceado formulado con especificaciones de niveles proteicos, energéticos y fibra.

Descarte: Remover un animal del hato, generalmente vendiendo el animal al mercado o al matadero.

Estabulación: Método de crianza en la cual los animales son restringidos en su espacio para suministrar alimento.

Faenamiento: Método específico para segar la vida ha animales de consumo.

Fibra soluble: es el tipo de fibra que es solvente en agua para así formar un material gelatinoso.

Forraje: Parte vegetativa de las gramíneas o de las leguminosas que contienen una alta proporción de fibra (más del 30% de fibra neutro-detergente), requeridos en la dieta en una forma física grosera (partículas de más de 1 o 2 mm de longitud). Puede ser pastoreado directamente o segado y preparado como heno o ensilaje.

Gramínea: Familia de plantas monocotiledóneas de tallo cilíndrico, nudoso y generalmente hueco, hojas alternas que abrazan el tallo, flores agrupadas en espigas o en panojas y grano seco cubierto por las escamas de la flor.

Lana: producción pilosa o lanosa de la piel de los ovinos, de crecimiento continuo.

Lúpulo: Planta herbácea trepadora de tallo áspero, largo y nudoso, hojas perennes

y acorazonadas, formadas por hasta siete lóbulos, flores pequeñas, con sexos separados y fruto seco, parecido a una piña.

Magro: se menciona de la carencia de grasa en la producción cárnica

Majada: lugar donde se recoge los animales y los pastores por la noche

Palatabilidad.- Se refiere a la calidad de un alimento que lo hace agradable al paladar, estimulando la respuesta del animal al consumir.

Pendulosas: inclinado o colgado hacia abajo

Piensos: alimento seco que se distribuye a los animales

Prolífica: que tiene la capacidad de reproducirse abundante y rápidamente.

Rastrojo: parte baja de las cañas después de segar.

Rumen: uno de los cuatro estómagos que posee los rumiantes.

Sistema extensivo: Se llaman sistemas extensivos a la crianza de animales que adquieren sus alimentos pastoreando a voluntad.